ENTOMOLOGIA
PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Inſectorum quæ in Agro Pariſienſi reperiuntur;

SECUNDUM methodum Geoffræanam in ſectiones, genera & ſpecies diſtributus:

CUI addita ſunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ Species.

Edente A. F. DE FOURCROY, Doct. Med. Pariſ.; è Reg. Scientiar. Academ.; è Reg. Soc. Medic. &c.

PARS SECUNDA.

PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

SECTIO TERTIA.
CLASSIS INSECTORUM.

Inſecta tetraptera alis farinaceis.

LXX. PAPILIO. *Le Papillon.*

Antennæ clavatæ.
Chryſalis nuda.

FAMIL. I. *Tetrapi.*

§. I.

Erucis ſpinoſis, alis anguloſis.

1. P. antiopa.

Le Morio.

Longueur 1 $\frac{1}{2}$ pouces. Largeur 3 pouces.

P. alis nigris, margine poſtico albido.

Locus. Larva habitat ſalicem.

2. P. jo.

Le Paon du jour, ou l'œil du Paon.

Long. 13 lig. Larg. 2 ½ pouc.

P. alis fulvis nigro maculatis, omnibus ocello cœruleo variegato.

Loc. Larva habitat urticam majorem.

3. P. polychloros.

La grande Tortue.

Long. 15 lig. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis fulvis nigro maculatis, primariis punctis quatuor nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

4. P. urticæ.

La petite Tortue.

Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis fulvis, nigro maculatis, primariis punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat urticæ majoris folia.

5. P. G album.

Le Gamma ou Robert-le-Diable.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis laceris fulvis nigro maculatis, ſecundariis ſubtus G albo notatis.

Loc. Larva habitat upulum & groſſulariam.

6. P. atalanta.

Le Vulcain.

Long. 13 lig. Larg. 2 ½ pouc.

P. alis nigris albo maculatis, omnibus faſciâ arcuatâ coccineâ.

Loc. Larva habitat urticam.

7. P. cardui.

La Belle-dame.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 5 lig.

P. alis fulvis albo nigroque variegatis, ſecundariis ocellis quinque.

Loc. Larva habitat carduum & cirſium.

§. II.

Erucis ſpinoſis, alis rotundatis.

8. P. paphia.

Le Tabac d'Eſpagne.

Long. 15 lig. Larg. 1 pouc. 7 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus lineis tranſverſis argenteis.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

9. P. aglaia.

Le grand Nacré.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis; ſubtus maculis 21 argenteis.

Loc. Idem.

10. P. lathonia.

Le petit Nacré.

Long. 10 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 37 argenteis.

Loc. Idem.

11. P. euphroſine.

Le Collier argenté.

Long. 7 ½ lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 9 argenteis.

Loc. Idem.

12. P. cinxia.

Le Damier.

Long. 6 lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro variegatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

Varietas A. Papilio alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

B. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

C. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis, & punctatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

D. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis & punctatis, utrinque faſciis tribus flavis.

Loc. Habitat ſylvas: larva o.

§. III.

Erucis non ſpinoſis, pedibus anticis breviſſimis collare non efficientibus.

13. P. ſilene.

Silene.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis rotundatis dentatis nigro-fuſcis, omnibus faſciâ albidâ, primariis ocello duplici, ſecundariis unico.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

14. P. hyperantus.

Le Triſtan.

Long. 9 lig. Larg. 18 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, ſubtus primariis ocello triplici, inferioribus quintuplici.

Loc. Idem.

15. C. ſaltator.

La Bacchante.

Long. 10 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, ſingulis ſubtus ocellis quinque & limbo pallidiore.

Loc. In ſylvis undèquaque volitat; larva o.

16. P. ægeria.

Le Tircis.

Long. 8 lig. Larg. 20 lig.

P. alis rotundatis dentatis fuſcis, fulvo maculatis, primariis ocello unico, ſecundariis ſuperne quadrupli.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

17. P. jurtina.

Le Corydon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, primariis ſubtus fulvis, ocello unico.

Loc. Idem.

18. P. mirtyllus.

Le Mirtil.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc.

P. alis rotundatis dentatis ſupra fuſcis, primariis maculâ fulvâ, infra è fulvo & fuſco undulatis, primoribus utrinque ocello.

Loc. Idem.

19. P. mœra.
Le Satyre.
Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.
P. alis rotundatis fulvo fuſcoque nebuloſis; primariis ſeſqui-ocello, ſecundariis ſuprà tribus, infrà ſeptem ocellis.
Loc. Habitat ſylvas, hortos; larva gramen Poa dictum.

20. P. amaryllis.
L'Amarylis.
Long. 7 ½ lig. Larg. 17 lig.
P. alis rotundatis fulvis oris fuſcis, primariis ocello duplici continuo, ſecundariis duobus, infrà fuſco cinereoque nebuloſis.
Loc. Habitat ſylvas; larva o.

21. P. pamphylus.
Le Procris.
Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.
P. alis rotundatis fulvis, oris fuſcis, primariis ſubtus ocello unico, ſecundariis ſubtus albo cinereoque variegatis.
Loc. Habitat erucas; larva ſocialis gramen filo intricato obveſtit.

22. P. çephalus.

Le Céphale.

Long. 7 lig. Larg. 17 lig.

P. alis rotundatis, ſuperioribus fulvis oris fuſcis, ſubtus ocello unico; ſecundariis ſuprà fuſcis, infrà cinereis, faſciâ albâ ocelliſque quinis.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

FAMIL. II. *Hexapi pedibus ſex unguiculatis, chryſalide horiſontali in medio filo ſuſpenſâ.*

§. I.

Caudiferi majores.

23. P. machaon.

Le grand Papillon à queue de fenouil.

Long. 28 lig. Larg. 3 pouc.

P. alis flavo nigroque variegatis, ſecundariis angulo ſubulato maculâque fulvâ.

Loc. Habitat ſylvas; larva fæniculum & umbelliferas.

24. P. flammæus.

Le Flambé.

Long. 18 lig. Larg. 3 pouc. 4 lig.

P. alis pallidè flavis, rivulis tranſverſis nigris, ſecundariis angulo ſubulato maculâque croceâ.

Loc. Habitat ſylvas.

§. II.

Caudiferi minores.

25. P. piſorum.

Le Porte-queue bleu ſtrié.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſuprà cœruleus, ſubtus lineis undulatis fuſcis & albicantibus ſtriatus, alis ſecundariis infrà faſcia albâ, maculâ duplici, nigro-auratâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas; larva coluteam, piſos, legumina.

26. P. quercûs.

Le Porte-queue bleu à une bande blanche.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſupra cœruleus ſubtus fuſcus, lineâ undulatâ tranſverſâ albicante, alis ſecundariis infrà maculâ duplici fulvâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas, larva quercûs folia.

27. P. betulæ.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches.

Long. 9 lig. Larg. 17 lig.

P. ſupra fuſcus maculâ flavâ, ſubtus fulvus lineâ duplici tranſversâ albidâ, alis ſecundariis in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas, larva betulam.

28. P. pruni.

Le Porte-queue brun à deux bandes de taches blanches.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. fuſcus, maculâ fulvâ, ſubtus faſciâ duplici tranſverſâ macularum albicantium, alis ſecundariis lunularum ferruginearum ſerie & in imo caudatis.

Varietas A. Papilio fuſcus, ſupra puncto albido, ſubtus lineâ tranſverſâ albâ, alis ſecundariis margine fulvo angulato, & in imo caudatis.

Loc. Larva habitat prunum, ulmum.

§. III.

Ocelliferi.

29. P. jris.

Le Mars.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 10 lig.

P. alis ſubangulatis, ſupra nigro violaceis; albo faſciatis, ſubtus fulvo, fuſco albidoque variis, ſingulis ocello nigro cœruleo.

Loc. Habitat hortos.

30. P. argus.

L'Argus bleu.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis, ſubtus ocellis numeroſis.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

31. P. ſemi-argus.

Le Demi-Argus.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis; ſubtus ocellorum faſciâ ſolitariâ.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

32. P. fuſciolus.

L'Argus brun.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro-fuſcis, faſciâ marginali fulvâ, ſubtus cinereis ocellis numeroſis.

Loc. Id. rarior.

33. P. rubi.

L'Argus myope.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro fuſcis fulvo maculatis, ſubtus ocellis numeroſis.

Loc. Id. rarior; larva habitat rubum.

34. P. cæcus.

L'Argus vert, ou l'Argus aveugle.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis, ſubtus viridibus immaculatis.

Loc. Idem.

35. P. virgaureæ.

Le Bronzé.

Long. 5 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fulvis, utrinque punctis nigris.

Loc. Habitat prata.

36. P. ſpeculifer.

Le Miroir.

Long. 6 lig. Larg. 15 lig.

P. nigro-fuſcus nitens, alis ſubtus limbo dentato fulvo, ſecundariis maculis duodecim albis.

Loc. Habitat ſylvas.

§. IV.

Divaricati.

37. P. divaricatus.

La Bande noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis fulvis, limbo nerviſque nigris, primariis maculâ oblongâ nigrâ.

Loc. Habitat prata.

38. P. malvæ.

Le Plein-chant.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis divaricatis denticulatis nigris, albo punctatis.

Loc. Larva habitat carduum fullonum & malvam.

39. P. tages.

Le Papillon griſette.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis cinereis, punctorum alborum ſerie duplici tranſverſâ.

Loc. Idem.

§. V.

Braſſicarii.

40. P. braſſicæ.

Le grand Papillon blanc du chou.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bimaculatis, apice nigris, major.

Loc. Habitat hortos; larva braſſicam.

41. P. rapæ.

Le petit Papillon blanc du chou.

Long. 11 lig. Larg. 23 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bimaculatis, apice nigris, minor.

Loc. Larva habitat rapam, braſſicam, cardamindum.

42. P. napi.

Le Papillon blanc veiné de vert.

Long. 7 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, inferioribus ſubtus faſciis vireſcentibus.

Loc. Idem.

43. P. cratægi.

Le Gaſé.

Long. 13 lig. Larg. 2 ½ pouc.

P. alis rotundatis albis; venis nigris.

Loc. Larva habitat cratægum, pomum ſylveſtrem, padum.

44. P. cardamines.

L'Aùrore.

Long. 8 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, ſecundariis ſubtus viridi-nebuloſis, primariis lunulâ nigrâ, maſculis maculâ croceâ.

Loc. Larva habitat thlaſpim.

45. P. luctuoſus.

Le Deuil.

Long. 9 lig. Larg. 23 lig.

P. alis dentatis, ſupra nigris, ſubtus fuſco-rubris, utrinque maculis albis faſciatim poſitis.

Loc. Habitat ſylvas.

46. P. leucomelanos.

Le demi-Deuil.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis rotundatis albis, lineis maculiſque nigris pulchrè teſſelatis.

Loc. Idem.

47. P. rhamni.

Le Citron.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 2 lig.

P. alis angulatis flavis, puncto ferrugineo.

Loc. Larva habitat rhamnum.

48. P. croceus.

Le Souci.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis luteis limbo nigro, primariis maculâ nigrâ, ſecundariis fulvâ.

Varietas A. Papilio alis croceis limbo nigro immaculato, primariis maculâ nigrâ, ſecundariis fulvâ.

B. Papilio alis croceis limbo nigro flavo maculato, primariis maculâ nigrâ, ſecundariis fulvâ.

C. Papilio alis ſulphureis, primariis limbo nigro faſciâ flavâ maculato, maculâque nigrâ, ſecundariis fulvâ.

Loc.

LXXI. SPHINX. *Le Sphinx.*

Antennæ priſmaticæ.
Chryſalis in puppa.

FAMIL. I. *Antennæ priſmaticæ ubique fere æquales, elingues.*

1. S. ocellata.

Le Demi-Paon.

Long. 17 lig.

S. elinguis alis angulatis, ſuperioribus fuſcis, inferioribus rubris ocello cœruleſcente.

Loc. Larva ſalicem habitat.

2. S. tiliæ.

Le Sphinx du tilleul.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis laceris ſuperioribus cinereo-vireſcentibus, faſciâ obſcuriore tranſversâ inæquali, inferioribus fuſco-aurantiis.

Loc. Larva habitat tiliam.

3. S. populi.

Le Sphinx à aîles dentelées.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis ſerratis, cinereo-fuſcis; ſuperioribus faſciis obſcurioribus tranſverſis, inferioribus baſi maculâ fulvâ.

Loc. Larva habitat populum.

4. S. bombyciformis.

Le Sphinx mouche.

Long. 5 lig.

S. elinguis, alis lanceolatis vitreis venis nigris, ſuperioribus maculâ limboque nigris, fulvoque nebuloſis.

Loc.

FAMILIA II. *Antennæ priſmaticæ ubique fere æquales, ſpirilingues.*

5. S. fuciformis.

Le Sphinx vert à aîles tranſparentes.

Long. 10 lig.

S. ſpirilinguis viridis alis vitreis pellucidis, venis limboque fuſco-ferrugineis.

Loc.

6. S. ſtellarum.

Le Moro-Sphinx.

Long. 13 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis nebuloſis, inferioribus ferrugineis.

Loc. Larva habitat gallium.

7. S. liguſtri.

Le Sphinx du troëne.

Long. 22 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis, inferioribus abdomineque faſciis tranſverſis rubris.

Loc. Larva habitat liguſtrum.

8. S. atropos.

Le Sphinx à tête de mort.

Long. 2 pouc. $\frac{1}{3}$. Larg. 9 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſco-nebuloſis, inferioribus abdomineque faſciis tranſverſis luteis, thorace maculis caput mortuum referentibus.

Loc.

9. S. convolvuli.

Le Sphinx à cornes de bœuf.

Long. 2 pouces.

S. ſpirilinguis alis omnibus fuſcis, faſciis dentatis obſcurioribus, abdomine faſciis tranſverſis rubris.

Loc. Larva habitat convolvulum.

10. S. elpenor.

Le Sphinx de la vigne.

Long. 16 lig.

S. ſpirilinguis, alis viridi purpureoque faſciatis, faſciis linearibus tranſverſis.

Loc. Larva habitat vitem.

11. S. euphorbiæ.

Le Sphinx du tithymale.

Long. 17 lig.

S. ſpirilinguis, alis viridi fulvo purpureoque varie faſciatis & maculatis ſubtus purpureis.

Loc. Larva habitat tithymalum.

12. S. porcellus.

Le Sphinx à bandes rouges dentelées.

Long. 1 pouce.

S. ſpirilinguis, alis viridi purpureoque faſciatis faſciis ſerratis tranſverſis.

Loc. Idem.

FAMILIA III. *Antennæ priſmaticæ in medio craſſiores, ſpirilingues. Larva villoſo, non cornigera.*

13. S. filipendulæ.

Le Sphinx belier.

Long. 8 ½ lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus ſubcœruleis punctis ſex rubris, inferioribus rubris.

Varietas A. Sphinx ſpirilinguis, alis rubris, ſuperioribus limbo maculiſque ſex nigris.

Loc. Larva habitat filipendulam, gramen.

LXXII. PTEROPHORUS. *Le Pterophore.*

Antennæ filiformes.
Lingua ſpiralis.
Alæ ramoſæ, ramis piloſis.
Chryſalis nuda, horizontalis.

1. P. pentadactyla.
Le Pterophore blanc.
Long. 1 pouce.
P. albus, alis ſuperioribus bipartitis, inferioribus tripartitis.
Loc.

2. P. didactyla.
Le Pterophore brun.
Largeur 10 lig.
P. fuſcus, alis ſuperioribus, apice bipartitis, inferioribus tripartitis.
Loc. Larva habitat convolvulum.

3. P. hexadactyla.
Le Pterophore en éventail.
Larg. 6 lig.

P. cinereus, fuſco maculatus, alis ſuperioribus octo partitis, inferioribus quadripartitis.

Loc. Larva habitat lonyceram periclymenum.

LXXIII. PHALŒNA. *La Phalene.*

Antennæ à baſi ad apicem decreſcentes.
Chryſalis in puppa.
Larva nuda.

Famil. I. *Pectinicornes.*

§. I.

Elingues alis reflexis.

1. P. pavonia major.
Le grand Paon de nuit.
Larg. 5 ½ pouc. Long. 2 pouc.
P. pectinicornis elinguis, alis cinereo-fuſcis, planiuſculis, ſingulis ocello, major.
Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

2. P. pavonia media.
Le Paon moyen.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo fuſcis planiuſculis, ſingulis ocello, minor.

Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

3. P. pavonia minor.

Le petit Paon.

Larg. 2 pouc. 5 lig. Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis alis planiuſculis ferrugineo fluteoque variis, ſingulis ocello faſciâque fuſcâ. *Maſc.*

P. pectinicornis elinguis, alis planiuſculis cinereis in medio albidis, ſingulis ocello faſciâque fuſcâ. *Fæmina.*

Loc. Larva habitat rubum & roſam.

4. P. coſſus.

Le Coſſus.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis, elinguis, alis albo-cinereis, ſtriis tranſverſis nebuloſis nigris, abdomine annulis albis.

Loc. Larva habitat lignum ſalicis.

5. P. vinula.

La Queue fourchue.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis diaphanis, vaſis obſcuris.

Loc. Larva habitat ſalicem & populum.

6. P. purpurata.

L'Ecaille mouchetée.

Larg. 23 lig. Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus flavis, inferioribus rubris, nigro maculatis.

Loc. Larva habitat ranunculum.

7. P. villica.

L'Ecaille marbrée.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus atris, areis flaveſcentibus, inferioribus luteis nigro maculatis, abdomine rubro.

Loc. Larva habitat ulmum.

8. P. caja.

L'Ecaille martre ou hériſſone.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis; ſuperioribus fuſcis, rivulis albis inferioribus purpureis, punctis ſex nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

9. P. monacha.

L'Ecaille couleur de roſe.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis alis deflexis; ſuperioribus albis, rivulis tranſverſis nigris, inferioribus roſeis, maculâ triplici nigrâ.

Loc.

10. P. teſtudinaria.

L'Ecaille brune.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus fuſcis, maculis luteis, inferioribus rubris maculis quatuor nigris.

Loc.

11. P. quercifolia.

La Feuille-morte.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis elinguis, tota rufa, alarum margine ſerrato.

Loc. Larva habitat gramen.

12. P. criſtata.

La Créte de coq.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, pallido-rufâ criſtâ dorſali nigrâ.

Loc.

13. P. quercûs.

Le Minime à bande.

Long. 1 pouce 9 lig.

P. pectinicornis elinguis rufa, alis rotundatis faſciâ pallidiore, ſuperioribus puncto albo.

Loc. Larva habitat fol. quercûs, ulmi, corni, ribeſiæ.

14. P. diſpar.

Le Zig-zag.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, faſciâ quadruplici tranſversâ nigrâ, acute undulatâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

15. P. pudibunda.

La Patte étendue.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, faſciis tranſverſis obſcurioribus, capite inter pedes porrectos.

Loc. Larva habitat prunum, &c.

16. P. annularis.

La Livrée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis pallidis, faſciâ alarum tranſverſali ſaturatiore.

Loc. Larva truncos arborum habitat, abundans.

17. P. palladia.

La Phalène chouette.

Long. 5, 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus faſciis pallido flavis nigriſque alternis longitudinalibus, inferioribus croceis faſciâ marginali nigrâ.

Loc.

18. P. mori.

Le Ver-à-ſoie.

P. pectinicornis elinguis tota alba, alis reflexis, bombix dicta.

Loc. Habitat provincias meridionales.

19. P. ſalicis.

L'Apparent.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, pedum annulis antenniſque nigris.

Loc. Larva habitat ſalicem.

20. P. chryſorrhæa.

La Phalène blanche à cul brun.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, fœminæ ano piloſo ferrugineo.

Loc. Larva habitat arbores quaſcumque.

21. P. lubricipeda.

La Phalène tigre.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis, punctis nigris; abdomine ordinibus quinque punctorum.

Loc. Larva habitat pomiferas arbores.

22. P. vernalis.

La Printaniere.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis albida nigro punctata, alis deflexis, ſuperioribus faſciâ duplici fuſcâ dentatâ nigro terminatâ.

Loc.

23. P. antiqua.

L'Etoilée.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis rotundatis fuſco-ferrugineis ſuperioribus maculâ albâ anguli ani; fœminâ apterâ.

Loc. Larva habitat prunum.

24. P. pomona.

La Phaléne jaune à aîles vertes.

Long. 6 lig.

P.

P. pectinicornis elinguis, antennis & corpore luteis, alis deflexis viridibus.

Loc.

25. P. roſea.

La Roſette.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis roſeis, ſuperioribus punctorum arcuumque ordine duplici.

Loc.

26. P. libatrix.

La Découpure.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo flavoque rufis margine laceris.

Loc.

27. P. cœruleo-cephala.

Le Double-Oméga.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis fuſcis maculâ duplici albido flaveſcente geminatâ.

Loc. Larva habitat pyrum, ceraſum, &c.

28. P. bucephala.

La Lunule.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis tectiformibus, ſuperioribus cinereis, faſciâ duplici ferrugineâ, & extremo circulariter palleſcente, ſubtus omnibus flaveſcentibus, faſciâ undulatâ fuſcâ.

Loc. Larva habitat tiliam & ulmum.

29. P. venoſa.

Le Bois veiné.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis exterioribus fuſcis, venis plurimis, faſciâ circulari, & marginis interioris appendice nigricantibus; inferioribus albidis limbo lineari fuſco.

Loc.

30. P. achatæa.

La Phalêne agathe.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis ſuperioribus cinereis fuſco marmoratis, inferioribus cinereis.

Loc.

31. P. bi-punctata.

Le Double point.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, limbo nigro punctato, ſuperioribus faſciâ duplici nigro luteâ, maculâque duplici albâ puncto nigro inſignitâ.

Loc.

32. P. jaſpoides.

La Phalêne jaſpée.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis margine ſinuatis, fulvo nigro fuſco roſeoque marmoratis, ſingulis ſubtus puncto nigro, ſuperioribus extremo dilatato recurvis.

Loc.

33. P. glauca.

La Phalêne-verdelet.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis viridibus; limbo maculâque anguli ani cinereo fuſcis.

Loc. Larva habitat ilicem

34. P. ſanguinolenta.

L'Enſanglantée.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis luteo rubris, faſciâ duplici tranſverſâ ſanguineâ.

Loc. Larva habitat acetoſam.

35. P. minutella.

La Mignonette.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

P. pectinicornis elinguis cinerea, alis ciliatis.

Loc.

* 36. P. ſubrubeſcens.

La Phalêne briquetée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis den-

tatis ſanguineo fuſcis, faſciis pallidioribus, interioribus angulo ani nigricante.

Loc.

* 37. P. inordinata.

La Griffonnée.

Long. 7 ½ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, lineis tranſverſis nigris acute undulatis, faſciis alternatim pallidioribus.

Loc.

* 38. P. obſcura.

L'Obſcure.

Long. 4 ½ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis nigro-fuſcis, ſuperioribus poſtice maculâ duplici fulvâ.

Loc.

39. P. areolata.

La Bordure à plaques.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. el., alis def. albis, maculâ inæquali tranſverſâ margineque interrupto fuſcis.

Loc.

* 40. P. punctata.

La Nervure picotée.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis def. fuſco-cinereis, nervis nigro punctatis.

Loc.

41. P. zona.

La Zone.

Long. 8 lig.

P. pect. el., alis patentibus angulatis fuſco-luteis, faſciâ duplici tranſverſâ.

Loc. Larva habitat ilicem.

42. P. angulata.

L'Anguleuſe.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. el., alis pat. angulatis cinereis, faſciâ duplici tranſverſâ, punctoque obſcuriore, atomis cineraſcentibus.

Loc.

43. P. bicincta.

La Double ceinture.

Long. 3 ½ lig.

P. pect. el., alis pat. flavis, lineis ſuperne tribus, inferne duabus tranſverſis fuſcis.

Loc.

* 44. P. monilifera.

La Phalêne à bracelets.

Long. 5 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-fuſcis punctis lineiſque tranſverſis nigris, pedibus albo nigroque interſectis.

Loc.

* 45. P. ſimplex.

La Griſonnette.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-pallidis, punctis lineiſque tranſverſis nigris, pedibus albidis.

Loc.

§. II.

Linguatæ alis deflexis.

46. P. vulpinaria.

La Bordure enſanglantée.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis ſpirilinguis, alis deflexis pallido luteis limbo roſeo, ſuperioribus maculâ, inferioribus faſciâ duplici fuſcâ.

Loc.

47. P. ſtuticus.

La Turquoiſe.

Long. 6 lig.

P. pect. ſp. viridi-cœrulea nitens, alis inferioribus fuſcis.

Loc.

48. P. triſtis.

Le Phalène brune à aîles inférieures blanches.

Long. 7 lig.

P. pect. ſp. alis deflexis nigro fuſcoque undulatis, inferioribus albis.

Loc.

49. P. domialla.

La Damerette.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. ſp. triangularis, alis deflexis nigro-roſeis, faſciis tranſverſis nigricantibus.

Loc.

50. P. frontana.

Le Toupet-tanné.

Long. 5 lig.

P. pect. ſp., corniculis criſtatis, alis deflexis ochroleucis, lineâ duplici tranſverſâ ſaturatiore.

Loc.

§. III.

Linguatæ alis planis.

51. P. lactea.

La Laiteuſe.

Long. 3 lig. Larg. 7 lig.

P. pect. ſp. alis patentibus rotundatis niveis, corpore flavo.

Loc.

52. P. fulvicans.

La Phalêne ſtriée fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. pect. ſp., alis pat. albido-luteis, omnibus fulvo tranſverſim denſe ſtriatis.

Loc.

53. P. cinerata.

Le Damas cendré.

Long. 4 lig. Larg. 8 lig.

P. pect. ſp. alis pat. cinereis, ſuperiorum margine exteriore maculâ triplici nigro-fuſcâ.

Loc.

54. P. inæqualis.

La Bande inégale.

Long. 7 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. ſp., alis pat. cin., fuſco nebuloſis, lineis tranſverſis inæqualibus.

Loc.

55. P. artrioſa.

La Bande rouge.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. ſp., alis pat. luteis, faſciâ tranſverſâ rubrâ.

Loc.

56. P. marginalis.

La Bande à point marginal.

Long. 5 lig.

P. pect. ſp., alis pat. cinereo-obſcuris, lineâ faſciâque alarum tranſverſâ obſcuriore, puncto marginali nigro.

Loc.

57. P. picta.

La Rayure jaune picotée.

Long. 5 lig.

P. pect. ſp. alis pat. flaveſcentibus, faſciis plurimis tranſverſis, nonnullis connexis atomiſque fuſcis.

Loc.

58. P. Bandevillæa.

La Griſaille.

Long. 11, 12, 14 lig.

P. pect. ſp., alis pat. cinereis, atomis maculiſque nigris.

Loc.

* 59. P. fimbriata.

La Frange pourprée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. ſp., alis pat. angulatis flaveſcentibus, faſciis tribus connexis fuſcis, limboque rubro, ſubtus punctatis.

Loc.

* 60. P. nayas.

La grande Nayade.

Long. 6 lig.

P. pect. ſp. alis pat. aqueo-viridibus, lineâ duplici tranſversâ albâ, antennis niveis.

Loc.

* 61. P. Malletina.

La Bordure maculée.

Long. 5 lig.

P. pect. ſp. alis pat. cinereis, ſuperiorum margine extremo maculis quatuor oblongis fuſcis, limbo fuſco.

Loc.

* 62. P. atomifera.

Le Damas blanc.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. ſp., alis pat. albis, faſciis tribus atomiſque luteſcentibus, oculis nigris.

Loc.

* 63. P. geminata.

La Bimaculée.

Long. 7 lig.

P. pect. ſp., alis pat. cinereis faſciis tranſverſis obſcurioribus, punctiſque nigris.

Loc.

* 64. P. virginalis.

La Virginale.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. ſp., alis pat. albis inferioribus puncto nigro.

Loc.

* 65. P. cartheſiana.

La Piqûure.

Long. 5 ½ lig.

P. pect. ſp., alis pat. fuſcis atomis obſcuris.

Loc.

* 66. P. nitidula.

La Brillante.

Long. 5 ½ lig.

P. pect. ſp., alis pat. albis nitentibus, atomis cinereis punctoque ſuperiorum nigro.

Loc.

* 67. P. miliata.

La Pointillée.

Long. 3 lig.

P. pect. ſp., alis pat. cinereis, fuſcis margineque nigro punctatis.

Loc.

68. P. immutata.

Les Atomes à une bande.

Long. 6 lig.

P. pect. ſp., alis pat. albidis, atomis cineraſcentibus, & faſciâ undulatâ ferrugineâ.

Loc.

FAMIL. II. *Antennis filiformibus.*

§. I.

Linguatæ alis planis.

69. P. microcoſma.

La Rayure blanche picotée.

Long. 5 lig. Larg. 13 lig.

P. ſeticornis, ſpirilinguis alis patentibus cinereis, faſciis plurimis tranſverſis nonnullis connexis, atomiſque fuſcis.

Loc.

70. P. clathrata.

Les Barreaux.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. fuſcis, utrinque maculis albis quadranguli teſſelatis.

Loc.

71. P. hortulana.

La Queue jaune.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſp. alis pat. albo fuſcoque nebuloſis, ano flavo.

Loc. Larva habitat urticam.

72. P. glyphica.

La Doublure jaune.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. ſupra fuſcis pone ſubtuſque flaveſcentibus.

Loc.

73. P. groſſulariata.

La Mouchetée.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ pouce.

P. ſet. ſp., alis pat. albis, maculis inæqualibus nigris plurimis, faſciâque tranſverſâ luteâ.

Loc. Larva habitat groſſulariam.

74. P. papilionaria.

Le Celadon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. ſinuatis, pallido-glaucis, faſciâque tranſverſâ obſcuriore.

Loc. Larva habitat ilicem.

75. P. ſambucaria.

La Souffrée à queue.

Long. 10 lig.

P. ſet. ſp. alis pat. ſulphureis, lineâ duplici tranſverſâ obſcuriore, inferioribus caudatis.

Loc. Larva habitat ſambucum.

76. P. luteola.

La Citronelle rouillée.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. luteis, duplici punctorum cinereorum ordine, ſuperioribus maculis duabus & rachi croceo-ferrugineis.

Loc.

77. P. marginata.

La Bordure entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, margine undique interrupte fuſcis.

Loc.

78. P. panthera.

La Phalêne panthère.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis pat. flavis, maculis numeroſis fuſcis.

Loc.

79. P. atomoſa.

Les Atômes à deux bandes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albidis, atomis cineraſcentibus, & faſciâ duplici undulatâ ferrugineâ.

Loc.

* 80. P. herbacea.

L'Herbacée.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. viridibus dentatis, lineâ duplici tranſverſâ albâ.

Loc.

81. P. bolonienſis.

La Phalêne blanche à tache & bande noires.

Long. 4 lig. Larg. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, ſuperioribus maculâ nigrâ & faſciâ duplici in extremo undulatâ.

Loc.

82. P. interſecta.

La Bande interrompue.

Long. 4 ½ lig. Larg. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. niveis, omnibus pone faſciâ undulatâ fuſcâ, ſuperiorum margine externo maculis nigris.

Loc.

83. P. ſtratiolata.

La Phalêne griſe à lignes brunes & point noir.

Long. 3 ½ lig. Larg. 9 lig.

P. ſet. ſp. alis pat. cinereis, faſciis linearibus fuſcis, punctoque nigro.

Loc. Larva aquatica habit. ſtratiot. & Potomageton.

84. P. ſtrigata.

La Phalêne blanche à lignes brunes ſans points.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, lineâ duplici undulatâ ſubfuſcâ.

Loc.

85. P. brocatella.

La Brocatelle d'or.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. luteis, lineolis fuſcis & albidis undulatis limbo dentato.

Loc. Larva habitat ilicem & ulmum.

86. P. alabaſtrina.

La Brocatelle d'argent.

Long. 5 lig. Larg. 10 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, lineolis faſciiſque plurimis undulatis fuſcis, limbo ſubdentato.

Loc.

87. P. fuſcata.

La Brocatelle brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. cinereis, faſciis plurimis fuſcis undulatis tranſverſis, limbo ſubdentato.

Loc.

88. P. circulifera.
Les quatre Omicrons.
Long. 4 lig.
P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, ſingulis faſcià undulatâ ſerratâ, & omicro albis.

Loc.

89. P. plebeia.
La Nervure brune.
Long. 3 ½ lig.
P. ſet. ſpiril., alis pat. cinereis, margine exteriore fuſco, punctoque alarum nigro.

Loc.

90. P. virgata.
La Phalêne à bandes vertes.
Long. 5 lig. Larg. 11 lig.
P. ſet. ſpiril., alis pat. viridi fuſcoque variegatis, faſcià triplici undulatâ obſcuriore.

Loc.

* 91. P. alternata.
La Veinée.
Long. 5 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. faſciis tranſverſis albis fuſciſque alternis.

Loc.

92. P. hieroglyphica.

L'Hyéroglyphe.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. dentatis cinereis, ſuperioribus litteris duabus & margine fuſcis.

Loc.

93. P. unduloſa.

L'Ondoyante.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albido-glaucis, faſciis arcuatis obſcurioribus.

Loc.

94. P. ſyrene.

La petite Nayade.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. è viridi glaucis, faſciâ duplici albidâ.

Loc.

* 95. P. humeralis.

L'Humérale.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, humeris faſciâque tranſversâ nigro fulvis.

Loc.

* 96. P. piloſellæ.

L'Auripeau.

Long. 5 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis. pat. flaveſcentibus, faſciis inæqualibus obſcuris punctoque nigro.

Loc.

* 97. P. aurantiaca.

La Bande orangée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. flaveſcentibus, faſciis aurantiis, circumflexis.

Loc.

* 98. P. lunularis.

La Phalêne en croiſſant.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril. alis pat. cinereis nitentibus, ſuperiorum puncto nigro, faſciâque marginali arcuatâ albâ.

Loc.

99. P. prolongata.

L'Apoſtrophe.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, ſuperioribus puncto prolongato atro.

Loc.

100. P. aſparagi.

La Damaſſée à points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril. alis pat. albidis nitentibus ſingulis puncto nigro, faſciiſque undulatis obſcuris.

Loc.

101. P. cordigera.

La Ceinture brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albidis, faſciis obſcuris ſingulis puncto nigro faſciâque latâ undulatâ fuſcâ.

Loc

* 102. P. eremitica.

La Zone blanche.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. nigris, maculis faſciâque tranſverſâ arcuatâ albâ, margine alarum albido.

Loc.

* 103. P. albeola.

La Blanchette à points.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albidis, ſingulis punctulo nigro.

Loc.

§. II.

Linguatæ, alis deflexis.

104. P. plantaginis.

La Phaléne chinée.

Long. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deflexis, ſuperioribus atris rivulis flavis, inferioribus rubris maculis nigris.

Loc. Larva habitat plantaginem.

105. P. jacobeæ.

La Phalêne carmin du ſéneçon.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril. alis ſuperioribus fuſcis, lineâ punctiſque duobus rubris, inferioribus rubris.

Loc. Larva habitat ſenecionem & jacobæam.

106. P. pronuba.

La Phalêne hibou.

Long. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis incumbentibus, exterioribus cæſiis nebuloſis, inferioribus luteis faſciâ atrâ marginali.

Loc. Larva habit. thlaſp. & cruciferas.

107. P. altica.

La Phalêne brune à tache jaune aux aîles inférieures.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deflexis, ſuperioribus nebuloſo - fuſcis, inferioribus nigris, maculâ margineque luteis.

Loc.

108. P. triplicata.

La Rayure à huit lignes.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereis, faſciis tranſverſis fuſcis e triplici lineâ compoſitis.

Loc.

109. P. rubricollis.

La Veuve.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigricantibus, collari purpureo, abdomine flavo.

Loc.

110. P. leucormelas.

L'Alchymiſte.

Long. 10 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. undulato nigris, inferioribus baſi albis.

Loc.

111. P. chryſitis.

Le Vert doré.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. ferrugineo-fuſcis faſciâ duplici tranſversá viridi-aureâ,

Loc.

112. P. pacta.

La Likenée rouge.

Long. 18 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. ſuperioribus cinereo fuſcoque nebuloſis, inferioribus rubris, faſciâ duplici tranſversâ nigrâ.

Loc. Larva habitat arbores.

113. P. fraxini.

La Likenée bleue.

Long. 2 pouc.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus cinereo fuſcoque undulatis, inferioribus nigris, faſciâ tranſversâ cœruleâ.

Loc. Larva habitat fraxin. rariſſima.

114. P. meticuloſa.

La Meticuleuſe.

Long. 10 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., margine eroſis, cinereo-fuſcis, ſuperioribus triangulo marginali fuſceſcente incarnatum includente; thorace gibbo.

Loc. Larva habit. pimpriſellam, abſinthium, &c.

115. P. mediata.

L'Aile brune à baſe fauve.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſuperioribus lineis rufis, baſique maculâ fulvâ.

Loc.

116. P. fluctuans.

Le Flot.

Long. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereo-fuſcis, ſuperioribus faſciâ undosâ triplici, punctoque obſcuro marmoratis.

Loc.

117. P. tripartita.

La Phaléne blanchâtre à deux bandes brunes.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albo-flaveſcentibus, faſciâ duplici tranſversâ fuſcâ.

Loc.

118. P. inchoata.

La Tache marginale.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albido-flaveſcentibus, faſciâ marginali oblongâ fuſcâ.

Loc.

119. P. quatrilis.

La Phaléne jaune à quatre points.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. flaveſcentibus, ſuperioribus ſingulis punctis duobus fuſcis.

Loc. Larva habitat ulmum.

120. P. decolorata.

La Décolorée.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albido fulvis immaculatis.

Loc.

121. P. pſi.
Le Pſi. ψ.
Long. 9 lig.
P. ſet. ſpiril., alis def. canis, maculis pſiformibus nigris.
Loc. Larva habitat poma.

122. P. gamma.
Le Lambda.
Long. 9 lig.
P. ſet. ſpiril., alis def. exterioribus fuſcis, lambda græco inſcriptis.
Loc. Larva habitat acetoſellam, &c.

123. P. omicron.
L'Omicron nébuleux.
Long. 11 lig.
P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus cinereo fuſcoque nebuloſis, lineis undulatis & omicro nigris, inferioribus cinereis.
Loc. Larva habitat ilicem, betulam, &c.

124. P. graphica.
L'Omicron géographique.
Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. ſuperioribus fuſcis, lineis undulatis & omicro albis, inferioribus cinereis.

Loc.

125. P. iota.

L'Iota.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albido-cinereis, lineis longis nigris.

Loc. Larva habitat abſinthium, abrotanum, ſantolinam.

126. P. verbaſci.

La Striée brune de verbaſcum.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., fuſco-cinereis, ſuperioribus fuſcis longitudinaliter ſtriatis.

Loc. Larva habitat verbaſcum, ſcrophulariam, amygdalum.

* 127. P. zonata.

La Double zone.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. luteſcentibus, faſciâ duplici tranſverſâ fuſcâ.

Loc.

128. P. herminata.

La Phalène petit gris.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſco-nebuloſis, ſuperioribus maculis irregularibus albis.

Loc.

129. P. navicularis.

La Brunette à aîles inférieures rougeâtres.

Long. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus fuſcis, lineis tranſverſis undulatis nigris, inferioribus ferrugineis.

Loc.

130. P. ſerrata.

La Dent de ſcie.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis ſubdeflexis, exterioribus cœſio purpureis, faſciis tranſverſis undulatis, interioribus pallidis, omnibus margine ſerrato.

Loc. Larva habitat humum.

131. P. bimaculata.

La Double tache.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus ferrugineo cinereis, maculâ duplici longâ rotundâque nigrâ, inferioribus albidis.

Loc.

132. P. teſſellata.

La Frange bigarrée.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſco-nebuloſis, limbo teſſellato, ſuperioribus maculâ duplici punctoque albis.

Loc. Larva habitat linariam.

133. P. xi.

L'Ix.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. cinereis, ſuperioribus faſciâ decuſſatâ fuſcâ, puncto nigro, lineiſque tranſverſis albidis.

Loc.

134. P. aſtroites.

La Phalêne noire à une tache blanche ſur chaque aîle.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. atris, ſingulis maculâ albâ.

Loc.

135. P. conſtellata.

La Phalêne noire à deux taches blanches ſur chaque aîle.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigris, ſingulis duabus maculis, & lineis undulatis albis.

Loc.

136. P. funebris.

La Phalene noire à lignes blanches.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigris, lineis punctis albis.

Loc.

137. P. bifaſciata.

La Phalêne brune à deux bandes blanches.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſuperioribus faſciâ duplici obliquâ albâ.

Loc.

138. P. nacarata.

Le Nacarat.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis roſeo purpureoque variegatis, ſuperioribus maculâ duplici marginali albâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

139. P. incarnata.

L'Incarnat.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. roſeis, ſuperioribus faſciâ duplici limboque albidis.

Loc.

140. P. areolata.

La Plaque dorée.

P. ſet. ſpiril., alis def nigro fuſcis, maculis plurimis albido-flaveſcentibus.

Loc. Larva habitat braſſicam.

141. P. forficalis.

La Bande eſquiſſée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. triangularis, alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obliquis.

Loc. Larva habitat braſſicam.

142. P. inverſa.

La Bande à l'envers.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril. triangularis, alis def. albo-vireſcentibus, ſubtus lineis duabus tranſverſis nigris.

Loc.

143. P. erecta.

La Phalène à ventre relevé.

Long. 4 ½ lig.

P. ſet. ſpiril. triangularis, alis ſuperioribus fuſco-purpureis, faſciâ tranſverſâ albido-ferrugineâ, abdomen ſuprà protendens.

Loc.

144. P. lemopicta.

La Phalène quadrille.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus nigris, punctis quatuor albis, inferioribus flavis fuſco marginatis.

Loc.

145. P. virginea.

L'Albâtre.

Long. 2 ½ lig.

P. ſet. ſpiril. alba, oculis nigris, antennis pedibuſque ſubflaveſcentibus.

Loc.

146. P. verrucoſa.

Le Toupet à points.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., corniculis magnis criſtatis alis fuſco-fumoſis, medietate poſticâ albidiore, punctis verrucoſis eminentibus.

Loc.

147. P. argyrata.

La Phaléne à trois bandes argentées.

Long. 1 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigris, faſciis tribus argenteis tranſverſis, tertiâ interruptâ.

Loc. Larva habitat cerefolium ſylveſtre.

148. P. cappata.

La Chappe brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, ferrugineo-fuſca, faſciis tribus tranſverſis ſaturatioribus.

Loc.

149. P. umbratilis.

La Chappe à bande & tache brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, aurato-flaveſcens, alarum faſciâ tranſverſâ maculâque duplici fuſcâ.

Loc.

150. P. denſata.

La Chappe brune au ſautoir.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril. , humeris latis, alis anticè pallidis faſciâ obliquâ fuſcâ, pone fuſcis faſciâ maculâque cinereis.

Loc. Larva habitat acerem.

151. P. anguloſa.

La Chappe jaune à bande brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, flava, faſciâ tranſverſâ fuſcâ.

Loc.

152. P. nitens.

La Chappe bronzée.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, fuſco-aurea, faſciâ duplici auratâ, maculâ purpureâ.

Loc.

153. P. flavipes.

La Chappe verte.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, antennis flaveſcentibus, alis dilute vireſcentibus.

Loc. Larva habitat folia ilicis.

154. P. nacellaris.

La Chappe verte à bande.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, alis viridibus, lineâ duplici tranſverſâ albidâ.

Loc. Idem.

155. P. fulvicornis.

La Phalêne verte ondée.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. viridibus, faſciâ duplici tranſversâ ſaturatiore.

Loc.

156. P. culiciformis.

La Phalêne culiciforme de l'éclaire.

Long. 2, 3 lig.

P. ſet. planilinguis, corpore roſeo alis rotundatis planiuſculis niveis, ſingulis puncto cinereo.

Loc. Larva habitat chelidonium majus.

* 157. P. duplicata.

La Phalêne à nervures noires.

Long. 7, 8 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. albis inferne nervis nigris.

Loc.

* 158. P. hilaris.

La Coquette.

Long. 13 lig.

P. ſet. ſpiril., denſe villoſa alis albis, maculis nigro-cœruleis conſperſa..

Loc.

159. P. irregularis.

La Clair-obſcure.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis ſuperioribus maculis irregularibus nigro-fuſcis, limbo pallido; inferioribus fuſcis, macularum albidarum ſerie duplici tranſversâ.

Loc.

160. P. fuſcoptera.

La Phalêne à trois points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., corpore flavo, oculis nigris, alis fuſcis ſuperioribus punctis tribus albis, inferioribus baſi flavis.

Loc.

161. P. dianæa.

La Lunaire.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis cinereis, margine interiore, & exteriore fuſcis, interne lunulâ.

Loc.

* 162. P. circulata.

Le Cerceau pointillé.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis fuſco-cinereis punctis nigris faſciatim diſpoſitis, & maculâ circulari.

Loc.

* 163. P. heſperidea.

L'Orangère.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis aurantiis, inferioribus baſi faſciâque nigrâ.

Loc.

* 164. P. graminea.

Le Lampas vert.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis virideſcentibus, faſciis irregularibus albis nigro terminatis.

Loc.

* 165. P. uſta.

La Phalène brûlée.

Long. 1 lig.

P. ſet. ſpiril., alis cinereo-nigris, & veluti deuſtis.

Loc.

* 166. P. milleſima.

La Millerage.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis albis, nervis longitudinalibus luteſcentibus denſis.

Loc.

* 167. P. heraclitæa.

Le Funéraire.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. fuſca, alis ſuperioribus maculis albidis longitudinaliter & tranſverſim poſitis.

Loc.

* 168. P. pulchella.

La Mignogne.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deſ. albis, lineis undulatis nigris, maculâ triplici obſcurâ, pedibus nigro interſectis.

Loc.

* 169. P. marina.

La Phalêne ondée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. fuſcis, faſciâ latâ tranſversâ, punctoque obſcuriore.

Loc.

* 170. P. chryſo-pallida.

La Damaſſée jaune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pallidis, faſciis undulatis luteis, mediâ latiore fuſcâ, puncto nigro.

Loc.

* 171. P. antrorum.

La Damaſſée brune.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, faſciis undulatis albis, ſubtus puncto nigro.

Loc.

* 172. P. nocturna.

La Nocturne.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſupra lineis quatuor undulatis obſcurioribus.

Loc.

* 173. P. mandarina.

La Mandarine.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, omnibus inferne, inferioribus ſupra faſciâ tranſversâ croceâ.

Loc.

* 174. P. ocularis.

L'Oculaire.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis corporis circumvolutis cinereis, albicantibus, maculâ internâ connexâ fulvâ.

Loc.

* 175. P. pomacea.

L'Omicron vert.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis ſuperioribus maculâ albâ faſciis undulatis, omicro viridibus inferioribus cinereis.

Loc.

* 176. P. columbina.

La Gorge de Pigeon.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. albido-roſeis nitentibus faſciis undulatis fuſcis.

Loc.

* 177. P. littorea.

La Brunette à taches en bordure.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, parte anticâ obſcuriore, poſticâ maculâ duplici fuſcâ.

Loc.

* 178.

* 178. P. multicolor.

La Marbrure brune.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deflexis, ſuperioribus fuſco fulvo albidoque marmoratis, inferioribus fuſcis.

Loc.

* 179. P. feneſtralis.

Le Grillage.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis antice faſciis tranſverſis confertis albidis.

Loc.

* 180. P. donzella.

La Donzelle.

P. ſet. ſpiril., capite nigro, alis def. pallidis, ſuperioribus faſciis albis ſtriiſque luteſcentibus minute marmoratis.

Loc.

* 181. P. pretioſa.

Le Jaſpe brun.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereis, fuſco nigroque marmoratis nitentibus.

Loc.

* 182. P. opalata.

L'Opale.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereo-fuſcis, limbo albido faſcià latâ ſinuatà ſubcœruleâ nitente.

Loc.

* 183. P. focorum.

Le Bord enfumé.

Long. 5 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albidis, ſubflaveſcentibus margine infimo fuceſcente.

Loc.

* 184. P. vinoſa.

La Vineuſe.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. antice albidis, poſticè rubeſcentibus, maculâ albicante punctoque nigro.

Loc.

* 185. P. pellicea.

L'Herminée.

Long. 4 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, maculis latis albis numeroſis connexis.

Loc.

* 186. P. doliata.

La Phalène à cerceaux jaunes.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, faſciis tranſverſis flavis nonnullis connexis.

Loc.

* 187. P. franciſcana.

La Brunette à ceinture.

Long. 3 lig.

P. ſeƈt. ſpiril. alis def. fuſcis, ſuperioribus maculis aliquot obſcuris, inferioribus tranſverſâ flavâ.

Loc.

* 188. P. ferruginea.

La Rouillée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſuperioribus maculis obſcuris ſubferrugineis.

Loc.

* 189. P. arcuata.

La Griſette à zig-zag.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., oculis nigris, antennis fulvis, alis deflexis albidis, faſciis arcuatis nigricantibus.

Loc.

* 190. P. Kermeſina.

Le Velours cramoiſi.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def., ſuperioribus rubeſcentibus, inferioribus rubris, puncto margineque nigris.

Loc.

* 191. P. hiſpana.

La Doublure brune.

Long. 4 ½ lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. infra fuſcis, ſupra lineis undulatis fuſcis.

Loc.

* 192. P. citrella.

La Jonquille.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. flavis, areis pallidioribus.

Loc.

* 193. P. ſinuoſa.

La Sinuée.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. utrinque flavis, lineis undulatis fuſcis.

Loc.

* 194. P. mediata.

La Ceinture griſe.

Long. 4 ½ lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. fuſcis, medietate poſticâ cinereâ, margine fuſco.

Loc.

* 195. P. ovata.

La Tache brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. flaveſcentibus, maculâ ovatâ fuſcâ.

Loc.

* 196. P. modeſta.

La Modeſte.

Long. 5 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albidis lineis tranſverſis maculâque duplici externâ oblongà fuſcis.

Loc.

* 197. P. circumſcripta.

L'Agathe brune.

Long. 6 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſco-nigricantibus, alarum ſuperiorum baſi & apice pallidioribus, lineâ duplici circumſcriptis.

Loc.

* 198. P. auriculata.

La Phalêne à panaches.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril. , alis def. ſubrubeſcentibus , faſciâ tranſverſâ luteſcente , margine alarum externo interſecto.

Loc.

* 199. P. roſacea.

La Chappe couleur de roſe.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril. , humeris latis , alis roſeis , maculâ externâ margineque flavis.

Loc.

* 200. P. anglica.

La Chappe griſe.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſect. ſpiril. humeris latis , cinerea , penicillis plurimis alarum elevatis.

Loc.

* 201. P. bidella.

La Chappe bedeaude.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, alis antice albis, poſtice fulvis.

Loc.

LXXIV. TINEA. *La Teigne.*

Antennæ filiformes à baſi ad apicem decreſcentes.

Frons prominula.

Larva involucro tecta.

Chryſalis in involucro larvæ.

1. T. hirondinella.

La Teigne à queue d'hirondelle.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. corniculis duobus ſubulatis recurvis, cinerea, alis maculâ fuſcâ.

Loc.

2. T. radiata.

La Teigne à bandes rayonnées.

Long. 5 lig.

T. corniculis duobus ſubulatis, alis flaveſcentibus nitidis, ſtriarum albidarum ordine duplici tranſverſo.

Loc.

3. T. corniculata.

La Teigne à rayure d'argent.

Long. 4 lig.

T. cinerea, corniculis duobus criſtatis, faſciâ alarum longitudinali argenteâ.

Loc.

4. T. evonymella.

La Teigne blanche à points noirs.

Long. 4 ½ lig.

T. alis ſuperioribus albis punctis nigris inferioribus fuſcis.

Loc. Larva ſocialis habitat folia pomorum.

5. T. arlequinetta.

L'Arlequinette jaune.

Long. 4 ½ lig.

T. alis flavis faſciis maculiſque nigris.

Loc.

6. T. pellionella.

La Teigne commune.

Long. 2 lig.

T. plumbæa nitida, puncto nigro in medio alarum.

Loc. Larva habitat veſtes laneas.

7. T. plumbæa.

La Teigne plombée nébuleuſe.

Long. 2 lig.

T. atro-plumbea, alis ſuperioribus fuſco-nebuloſis.

Loc.

8. T. melanopis.

La Teigne blanche.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. tota alba oculis nigris.

Loc.

9. T. marginatella.

La Teigne à bordure de points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinerea, alarum margine inferiore punctis nigris.

Loc.

10. T. crucifera.

La Teigne à croix de S. André.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. aurata, alis ſuperioribus cruce decuſſatâ fuſco rubrâ.

Loc.

11. T. granella.

La Teigne brune à tête blanchâtre.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota fuſco-nebuloſa, capite albido.

Loc. Larva habitat domos.

12. T. equeſtris.

La Teigne à croix de Chevalier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fuſca, cruce dorſi decuſſatâ albâ.

Loc.

13. T. tapetzella.

La Teigne bedeaude à tête blanche.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra capite niveo, alis pone albidis.

Loc. Larva lanam, pennas avium devorat, muſæis infeſta.

14. T. bidella.

La Teigne bedeaude à tête brune.

Long. 4 lig.

T. fuſca capite fuſco, alis pone albidis.

Loc.

15. T. bicolorata.

La Teigne bedeaude à trois triangles.

T. nigra, alis ponè albidis, maculâ triplici triangulari nigrâ.

Loc. Larva habitat glandes.

16. T. quadratella.

La Teigne à quarrure.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis nigris, ſuperioribus maculâ quadratâ albâ ex quatuor lineolis albis tranſverſis compoſitâ.

Loc. Larva habitat ſylvas.

17. T. inverſella.

La Teigne à quadrille.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, alis antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

Loc.

18. T. monilifera.

La Teigne à deux rangs de points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. alis atris, punctorum alborum lineâ duplici tranſverſâ.

Loc.

19. T. nebuloſella.

La Teigne marbrée à plaques brunes.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig.

T. cinerea, alarum maculis nigro-nebuloſis.

Loc. Larva habitat domos.

20. T. undulatella.

La Teigne à quatre bandes brunes ondulées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis delute cinereis, faſciis tribus fuſcis tranſverſis undulatis.

Loc.

21. T. circumvoluta.

Le Manteau à points.

Long. 8 lig.

T. alis argenteis, corpori circumvolutis faſciâ duplici tranſversâ punctorum nigrorum.

Loc.

22. T. ochrocephala.

Le Manteau à tête jaune.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. alis albis corpori circumvolutis, capite collarique flavis.

Loc.

23. T. viridella.

Le Manteau à bandes verdâtres.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis corpori circumvolutis albido-roſeis, faſciis tribus obſcurè vireſcentibus.

Loc.

24. T. crocella.

Le Manteau jaune.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis croceis, oculis pedibuſque nigris.

Loc.

25. T. roſella.

Le Manteau couleur de roſe.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis abeſcentibus margine roſeo.

Loc.

26. T. rhomboidella.

Le Lozange cendré.

Long. 3 lig.

T. fuſco-cinerea, alarum maculâ rhomboideâ albidâ oblongâ.

Loc.

27. T. nervoſa.

La Teigne à nervures.

Long. 5 lig.

T. alis cinereis, ſuperioribus nitentibus nervis multifidis fuſcis.

Loc.

28. T. Reaumurella.

La Teigne noire bronzée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis, antennis corpore duplo longioribus.

Loc. Larva habitat arbores.

29. T. de Geerella.

La Coquille d'or.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, alis ſuperioribus lineis longitudinalibus, faſciâ latâ tranſversá infernèque radiis plurimis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Larva habitat ſalicem.

30. T. intermediata.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lig.

T. alis flaveſcentibus, lineis duabus &

maculâ intermediâ fuſcis in extremo ſuperiorum.

Loc.

31. T. bimaculoſa.

La Teigne à deux taches jaunes en bordure.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fuſco-rubra, alarum ſuperiorum margine exteriore maculis duabus flavis.

Loc.

32. T. funigera.

La Teigne Cordelière.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, faſciâ tranſversâ albâ.

Loc.

33. T. mays.

La Teigne à deux taches blanches en bande.

Long. 3 lig.

T. fuſco-rubra, alis ſuperioribus maculis duabus croceis tranſverſim poſitis.

Loc. Larva habitat ſemina mays.

34. T. marmorella.

La Teigne à marbrure.

Long. 5 lig.

T. nigro-fuſca, rivulis flaveſcentibus marmorata.

Loc.

34. T. xiloſtella.

La Teigne à bandelette blanche.

Long. 3 lig.

T. cinerea, dorſo vittâ longitudinali albâ.

Loc.

36. T. trifaſciata.

La Teigne griſe à trois ſautoirs bruns.

Long. 3 ½ lig.

T. cinerea, alarum faſciâ triplici obliquâ undulatâ fuſcâ.

Loc.

37. T. thoracica.

La Teigne à corcelet rayé.

Long. 4 lig.

T. capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuſcis, alis albo-flaveſcentibus, faſciis tranſverſis fuſcis.

Loc.

38. T. intermittens.

La Teigne à bande interrompue.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. albo-flaveſcens, faſciis duabus obliquis ferrugineis, poſteriore interruptâ.

Loc.

36. T. ternatella.

La Teigne à triangle marginal.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alba margine alarum exteriore maculis tribus fuſcis, triangulum referentibus.

Loc.

40. T. quinnata.

La Teigne blanche à cinq bandes brunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

T. alba, alis ſuperioribus lineis quinque tranſverſis fuſcis.

Loc. Larva habitat ſepes.

41. T. herminata.

La Teigne à bordure herminée.

Long. 2 lig.

T. fuſca, lineâ duplici tranſversâ flavâ, margine alarum undique flavo interſecto.

Loc. Larva habitat lichenem ſcriptum.

42. T. annulifera.

La Teigne à bande dorée & anneau blanc aux antennes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. alis ſuperioribus nigris, faſciâ longitudinali maculiſque duabus aureis, antennis medio albis.

Loc.

43. T. Merianella.

La Teigne dorée à bandes d'argent.

Long. 1 lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis tranſverſis tribus antennis extremo albis.

Varietas A. T. Wilkella.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis tranſverſis quatuor, antennis nigris.

Loc. Habitat folia ulmi.

44. T. Malletella.

La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis, capitis vertice alarumque faſciâ tranſversâ flavis.

Loc.

45. T. Linnæanella.

La Teigne dorée à quatre points d'argent.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. flavo-aurata, punctis quatuor argenteis, antennarumque apice albo.

Loc.

46. T. plumbæa.

La Teigne crayonnée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. crocea, lineis tranſverſis fuſco-argenteis interruptis, alarum medio maculâ albâ punctiſque plumbeis.

Loc.

47. T. mucoſa.

La Teigne moiſie.

Long. 4 lig.

T. albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuſcis, involucro villoſo-abeſcente.

Loc. Larva habitat gramen.

48. T. pedifera.

La Teigne à fourreau en croſſe.

Long. 4 lig.

T. alis cinereis, lineis albis faſciàque longitudinali fuſcâ, involucro fuſco pediformi.

Loc. Larva habitat ilicem.

49. T. lamellifera.

La Teigne à fourreau à deux lames.

Long. 3 lig.

T. nigro-cinerea, involucro fuſco recurvo lamina duplici folioſâ tectâ.

Loc. Larva habitat folia arborum.

50. T. palearis.

La Teigne à fourreau de paille ſimple.

T. involucro palearam ordine unico tecto.

Loc. Idem.

51. T. faſciculifera.

La Teigne à fourreau de paille compoſé.

T. involucro palearum longitudinalium ordine multiplici compoſito.

Loc. Larva habitat herbam pratorum.

52. T. graminifera.

La Teigne à fourreau de pailles tranſverſes.

T. involucro ex paleis tranſverſis compoſito.

Loc. Larva habitat herbam pratorum.

53. T. lichenoſa.

La Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.

T. lapidum, involucro conico recurvo.

Loc. Larva habitat lichenem parietinum.

54. T. lapidoſa.

La Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.

T. lapidum, involucro triangulari.

Loc. Idem.

* 55. T. cincta.

La Teigne d'or à anneaux.

Long. 4 lig.

T. fuſca, alis ſuperioribus flavis; punctis margine externo, circuloque infra croceis.

Loc.

* 56. T. punctulata.

La Teigne à points noirs.

Long. 3 lig.

T. cinerea, alis ſuperioribus punctorum nigrorum tribus paribus.

Loc.

* 57. T. atratella.

La Teigne jaune.

Long. 2 lig.

T. tota atra.

Loc.

* 58. T. virgata.

La Teigne à bande noire.

Long. 2 lig.

T. fuſco-cinerea, faſciâ tranſversâ piliſque flavo-aureis.

Loc.

* 59. T. vittata.

La Teigne à ceinture blanche.

Long. 2 lig.

T. nigro-fuſca, faſciâ tranſversâ albâ.

Loc.

* 60. T. ſignatella.

La Teigne brochée d'or.

Long. 3 lig.

T. alba, ſignaturis fulvis aureiſque marmorata, margine alarum externo albo interſecto.

Loc.

* 61. T. lucidula.

La Mine de plomb.

Long. 3 ½ lig.

T. fulva, fuſco lineiſque plumbeis marmorata punctis plumbeis.

Loc.

* 62. T. radiatella.

Le Manteau rayone.

Long. 5 lig.

T. fuſca, alis corpori circumvolutis fuſcis, faſciis longitudinalibus radiatis albis.

Loc.

* 63. T. ſcapulata.

La Teigne à mantelet.

Long. 2 ½ lig.

T. cineraſcens, faſciis tranſverſis fuſcis, capite collarique albo, oculis nigris.

Loc.

* 64. T. turcica.

L'Ottomane.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, alarum baſi maculâ duplici lunulari albâ.

Loc.

* 65. T. craſſicornis.

La Teigne à groſſes antennes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, antennis craſſis, alarum baſi, faſciâque tranſversâ luteâ.

Loc.

* 66. T. purpuratella.

La Purpurine.

Long. 4 lig.

T. nigro-violacea, alis antice-flavis poſtice maculâ marginali flavâ, lineis cœruleis nitentibus, pedibus annulis albis.

Loc.

* 67. T. cinerata.

Le Manteau cendré.

Long. 4 lig.

T. alis corpori circumvolutis albid's, margine cinereo.

Loc.

* 68. T. antennulata.

La Lozange jaune.

Long. 3 ½ lig.

T. atra, alarum baſi maculâ longitudinali, margine externo puncto medio, maculâ rhomboidææ flavis, antennis medio albis.

Loc.

* 69. T. citrinella.

La Citrine.

Long. 4 ½ lig.

T. alis ſuperioribus flavis, maculis aliquot aurantiis.

Loc.

* 70. T. pallidula.

La Paillette.

Long. 4 lig.

T. corpore fuſco, oculis nigris, alis pallido-flavis.

Loc.

* 71. T. tan.

Le Tan.

Long. 4 lig.

T. cinereo fuſcoque marmorata, alarum apice lineâ albâ acutè circumflexâ.

Loc.

* 72. T. argentinetta.

La Teigne brochée d'argent.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig.

T. fuſco-violacea, lineis punctiſque argenteo-violaceis.

Loc.

* 73. T. ſtellata.

La Tache de neige.

Long. 3 lig.

T. crocea ſubviolacea, margine externo maculâ albidiſſimâ.

Loc.

* 74. T. aurantiaca.

La Teigne orangée.

Long. 3 ½ lig.

T. corniculis duobus criſtatis nigro-cœrulea, alarum parte ſuperiore maculiſque duabus flavis.

Loc.

SECTIO QUARTA
CLASSIS INSECTORUM.

Inſecta tetraptera alis nudis.

ARTICULUS PRIMUS.

Tarſorum articuli tres.

LXXV. LIBELLULA. *LA DEMOISELLE.*

Antennæ breviſſimæ.
Os maxilloſum.
Cauda maſculis forcipata.
Ocelli tres ante aut inter oculos.

FAMILIA I. *Alis erectis.*

1. L. ludovicea.
La Louiſe.
Long. 21 lig.

L. corpore viridi-cœruleo nitido, alis medio cœruleſcentibus, baſi & apice albidis margine immaculato.

Loc. Habitat prata & ſtagnorum ripas.

2. L. virgo.

L'Ulrique.

Long. 20 lig.

L. corpore viridi ſericeo, alis ſubfuſcis puncto marginali albo.

Loc. Idem.

3. L. puella.

L'Amélie.

Long. 14 lig.

L. corpore cœruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

4. L. dorothæa.

La Dorothée.

Long. 14 lig.

L. corpore infra cœruleo-viridi ſupra fuſco, thorace faſciis fuſcis cœruleſcentibuſque alternis, puncto alarum marginali nigro.

Varietas A. L. corpore infra fulvo, ſupra nigro, thorace fulvo fuſcoque variegato, puncto alarum marginali fuſco.

Loc. Habitat prata & ſtagnorum ripas.

5. L. ſophia.
La Sophie.
Long. 16 lig.
L. corpore viridi pallide incarnato, thorace faſciis tribus longitudinalibus nigris, alis puncto marginali fuſco.
Loc. Idem.

6. L. adelais.
L'Adélaide.
Long. 17 lig.
L. corpore viridi ſericeo, alis albis; puncto marginali.
Loc. Idem.

FAMILIA II. *Alis patentibus.*

7. L. quadrimaculata.
La Françaiſe.
Long. 19 lig.

L. alis maculâ duplici marginali.

Loc. Id. rariſſima.

8. L. flaveola.

L'Eléonore.

Long. 16 lig.

L. alis albis, baſi luteis abdomine luteſcente.

Loc. Habitat amnium ripas.

9. L. philintha.

La Philinthe.

L. alis albis, baſi luteis; abdomine ſupra pulvere cinereo-cœruleſcente conſperſo.

Loc. Idem.

10. L. ſylvia.

La Sylvie.

Long. 2 pouces.

L. thorace viridi nitido, lineis flavis; alis albis abdomine nigro cœruleſcente.

Loc. Idem.

11. L. Ænea.

L'Aminthe.

Long. 18 lig.

L. viridi-inaurata, alis pallidis, pedibus nigris.

Loc. Habitat amnium ripas.

12. L. vulgatiſſima.

La Juſtine.

Long. 17 lig.

L. lateribus flava, alis albis.

Loc. Idem.

13. L. grandis.

La Julie.

Long. 28 lig.

L. fulva alis flaveſcentibus, thoracis lateribus lineis duabus flavis, fronte flaveſcente, caudâ diphyllâ.

Loc. Idem.

14. L. forcipata.

La Caroline.

Long. 23 lig.

L. thorace luteo vireſcente lineis nigris, abdomine nigricante caracteribus flavis.

Loc. Habitat amnium ripas.

15. L. cecilia.
La Cécile.

L. thorace vireſcente abdomine fuſco caracteribus flavis.

Loc. Idem.

* 16. L. victoria.
La Victoire.

Long. 15 lig.

L. corpore flavo, abdomine cylindrico, alarum baſi flavicante.

Loc. Idem.

LXXVI. PERLA. *LA PERLE.*

Antennæ filiformes.
Alæ incumbentes, cruciatæ æquales.
Os tentaculis quatuor.
Cauda biſeta.
Ocelli tres.

1. P. bicaudata.

La Perle brune à raies jaunes.

Long. 8 lig.

P. fuſca, capite thoraceque lineâ longitudinali flavâ alis fuſco reticulatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. P. flavipes.

La Perle brune à pattes jaunes.

P. fuſca, abdominis lateribus pedibuſque pallido flavis, alis fuſco-venoſis.

Loc. Idem.

3. P. nebuloſa.

La Perle brune à aîles pâles.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro-fuſca, alis ſubcinereis pallidis, caudæ ſetis truncatis.

Loc. Idem.

4. P. flava.

La Perle jaune.

Long. 2 lig.

P. flava, alis albis oculis nigris.

Loc. Idem.

ARTICULUS SECUNDUS.

Tarſorum articuli quatuor.

LXXVII. RAPHIDIA. *LA RAFIDIE.*

Antennæ fi iformes.
Alæ incumbentes.
Os tentaculis quatuor.
Cauda nauda.
Ocelli tres.

1. R. ophiopſis.
La Rafidie.
Long. 6 lig.
Raphidia.
Loc. Habitat ſylvas, rara.

ARTICULUS TERTIUS.

Tarſorum articuli quinque.

LXXVIII. EPHEMERA. *L'EPHÉMÈRE.*

Antennæ breviſſimæ.
Alæ inferiores multo breviores.
Cauda ſetoſa.
Ocelli tres magni ante oculos.

1. E. vulgata.

L'Ephémère à trois filets & aîles tachetées.

Long. 8, 9. lig.

E. alis nebuloſo-maculatis, caudâ triſetâ.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

2. E. reticulata.

L'Ephémère à trois filets & aîles réticulées.

Long. 5 lig.

E. lutea, alis albis reticulatis, caudâ triſetâ.

Loc. Idem.

3. E. virideſcens.

L'Ephémère à trois filets & aîles brunes.

E. luteo-fuſca, alis fuſco-viridibus, caudâ triſetâ.

Loc. Idem.

4. E. nigra.

L'Ephémère noire à trois filets.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

E. nigra, caudâ triſetâ.

Loc.

5. E. lutea.

L'Ephémère jaune à deux filets & aîles réticulées.

Long. 4 lig.

E. lutea, alis albis reticulatis, caudâ biſetâ.

Loc.

6. E. culiciformis.

L'Ephémère à deux filets & aîles blanches.

Long. 2 lig.

E. fuſca, caudâ biſetâ, alis albis.

Loc.

7. E. bioculata.

L'Ephémère à deux filets & aîles brunes.

E. thorace fuſco, abdomine albo, caudâ biſetâ, alis fuſcis ſtriatis.

Loc. Habitat aquatica prata.

8. E. horaria.

L'Ephémère à deux filets & aîles marginées.

Long. 3 lig.

E. alis albis, margine craſſiore, nigricantibus, caudâ biſetâ.

Loc. Habitat domos.

LXXIX. PHRYGANEA. *LA FRIGANE.*

Antennæ filiformes.

Alæ laterales, tectiformes, pone aſſurgentes.

Os tentaculis quatuor.

Cauda nuda.

Ocelli tres.

1. P. ſtriata.

La Frigane de couleur fauve.

Long. 11 lig.

P. alis teſtaceis, nervoſo-ſtriatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. P. rhombica.

La Frigane panachée.

Long. 7 lig.

P. alis deflexo compreſſis flaveſcentibus maculâ rhombeâ laterali albâ.

Loc. Habitat amnium ripas.

3. P. vulgata.

La Frigane brune à aîles fauves.

Larg. 5 lig.

P. nigro-fuſca, alis pedibuſque teſtaceis.

Loc. Idem,

4. P. plumbea.

La Frigane plombée à aîles fauves.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. atra, alis plumbeis pedibus fulvis,

Loc. Idem.

5. P. interſecta.

La Frigane à antennes panachées.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. cinereo-fuſca, ſuturâ alarum maculâ albâ, antennis albo fuſcoque interſectis corpore duplo longioribus.

Loc. Idem.

6. P. maculata.

La Frigane à aîles tachetées & courtes antennes.

Long. 4 lig.

P. alis ſuperioribus nebuloſis, antennis longitudine corporis.

Loc. Habitat amnium ripas.

7. P. longicornis.

La Frigane à aîles tachetées & longues antennes.

Long. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig

P. alis ſuperioribus nebuloſis nigro-punctatis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Idem.

8. P. venoſa.

La Frigane noire à aîles pâles & veinées.

Long. 5 lig.

P. atra, pedibus albis, alis pallidis venoſis.

Loc. Idem.

9. P. viridis.

La Frigane verte.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, alis niveis.

Loc. Habitat amnium ripas.

10. P. ſex-punctata.

La Frigane à aîles ponctuées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

P. fuſca, alis albis fuſco maculatis.

Loc. Idem.

11. P. funerea.

La Frigane mouche en deuil.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

P. tota atra, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

12. P. muſciformis.

La Frigane-mouche de couleur pâle.

P. fuſca, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus, alis pallidis venoſis.

Loc. Habitat amnium ripas.

13. P. variegata.

La Frigane marbrée à pattes panachées.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

P. nigro-fuſca, maculis cinereis, pedibus nigro cinereoque interſectis.

Loc. Idem.

14. P. lugubris.

La Frigane enfumée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. tota atra, alis fuſcis, venis nigris.

Loc. Idem.

15. P. nervoſa.

La Frigane à nervures.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

P. pallida, alis albis, nervis fuſco punctatis.

Loc. Idem.

16. P. atra.

La Frigane ſavoyarde.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. tota atra oblonga, alis nigris.

Loc. Habitat amnium ripas.

17. P. gallata.

La Frigane demi-deuil.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. nigra, faſciâ duplici albâ interruptâ, antennis albo interſectis.

Loc. Idem.

LXXX. HEMEROBIUS. *L'HÉMEROBE.*

Antennæ filiformes.
Alæ ſæpe æquales.
Os prominens tentaculis quatuor.
Cauda nuda.
Ocelli nulli.

1. H. perla.

Le Lion des puccrons.

Long. 6 lig.

H. luteo-viridis, alis aqueis vaſis viridibus.

Loc. Habitat arbores, roſam.

2. H. chryſops.

L'Hémerobe à aîles ponctuées.

Long. 3 lig.

H. luteus, alis aqueis, vaſis fuſco punctatis.

Loc. Habitat hortos.

3. H. flavilater.

L'Hémerobe aquatique.

Long. 7 lig.

H. ater, alis fuſcis nigro-reticulatis, margine exteriore dilatato.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

LXXXI. FORMICALEO. *Le Fourmilion.*

Antennæ breves, clavatæ, craſſæ.

Alæ æquales.

Os prominens tentaculis quatuor.

Cauda nuda.

Ocelli nulli.

1. F. noſtras.

Le Fourmilion.

Long. 12 lig.

Loc. Habitat arenam.

LXXXII. PANORPA. *LA MOUCHE-SCORPION.*

Antennæ longæ filiformes.

Alæ æquales.

Roſtrum corneum cylindraceum.

Cauda chelifera forficibus armata.

Ocelli tres.

1. P. communis.

La Mouche-Scorpion.

Long. 7, 8 lig.

Loc. Habitat prata ad amnes.

LXXXIII.

LXXXIII. CRABRO. *Le Frélon.*

Antennæ clavatæ.
Alæ inferiores breviores.
Os maxilloſum.
Aculeus ani dentatus.
Abdomen ubique æquale thoraci connatum.
Ocelli tres.

1. C. humeralis.
Le Frélon à épaulettes.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig.
C. niger, ſubhirſutus, fronte, thorace ſuperne, abdomineque flavis, ſegmento 1°, 2° & 4° ex parte nigris.
Loc.

2. C. maculatus.
Le Frélon à échancrure & ventre jaune.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig.
C. niger, abdomine flavo, ſegmentis tribus ſuperioribus nigris maculis flavis.
Loc.

R

3. C. lunulatus.

Le Frélon noir à échancrure.

Long. 1 pouc. Larg. 3 ½ lig.

C. totus niger, abdominis ſegmento primo ovatim margine inciſo lunulà flavâ.

Loc.

* 4. C. annulatus.

Le Frélon à corcelet noir.

Long. 10 lig. Larg. 3 ½ lig.

C. ferrugineus, thorace ſuperne abdominique ſegmento primo nigris.

Loc.

LXXXIV. UROCERUS. *L'UROCÈRE.*

Antennæ filiformes.

Alæ inferiores breviores.

Os maxilloſum.

Aculeus ani dentatus prominens corniculo tectus.

Abdomen ubique æquale thoraci connatum.

Ocelli tres.

1. U. gigas.

L'Urocère.

Long. 13 lig. Larg. 3 lig.

Loc.

LXXXV. TENTHREDO. *La Mouche-a-scie.*

Antennæ filiformes.

Alæ inferiores breviores.

Os maxilloſum.

Aculeus ani dentatus non prominens.

Abdomen ubique æquale thoraci connatum.

Ocelli tres.

FAMIL. I. *Antennis novem-nodiis.*

1. T. hebraica.

La Lettre hébraïque verte.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. viridis, capite thoraceque ſupra caracteribus nigris.

Loc. Habitat flores.

2. T. crocea.

La Mouche-à-ſcie ſafranée.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. crocea, antennis oculiſque nigris.

Loc. Habitat flores.

3. T. melanocephala.

La Mouche-à-ſcie ſafranée à tête noire.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. crocea, capite, pedibus, thoraciſque apice nigris.

Loc. Idem.

4. T. roſæ.

La Mouche-à-ſcie du roſier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. crocea, capite thorace ſupra, alarumque margine exteriore nigris.

Loc. Habitat roſam.

5. T. ochroptera.

La Mouche-à-ſcie noire à aîles jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigro-cœruleſcens; pedibus, tibiis aliſque exterioribus croceis, maculâ marginali fuſcâ.

Loc.

6. T. maculata.

La Mouche-à-ſcie noire, à ventre jaune noir en haut & en bas.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, thorace maculis flavis, abdomine luteo baſi & apice nigro, pedibus variegatis.

Loc.

7. T. unifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à une bande jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, ſegmentis abdominalibus quarto & quinto luteis.

Loc.

8. T. punctata.

La Mouche-à-ſcie noire marquée de jaune ſur le premier & dernier anneau du ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigro-cœrulea, alis pedibuſque flavis, ſegmentis abdominalibus primo & ultimo maculâ luteâ.

Loc.

9. T. bifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à deux bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmentis abdominalibus primo & quinto luteis.

Loc. Habitat plantas umbelliferas.

10. T. trifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à trois bandes jaunes.

Larg. 4 $\frac{2}{3}$ lig. Long. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque ſegmentis primo, quinto, ſexto & ultimo margine flavis.

Loc.

11. T. ruſtica.

La Mouche-à-ſcie à quatre bandes jaunes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium marginibus, excepto ſecundo, tertio & ſexto, flavis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat ſalicem.

12. T. virgata.

La Mouche-à-ſcie à deux bandes noires ſur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigra, pedibus ſegmentorumque abdominalium marginibus, excepto ſecundo, tertio & quinto, flavis.

Loc.

13. T. ſcrophulariæ.

La Mouche-à-ſcie de la ſcrofulaire.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium marginibus, excepto ſecundo & tertio, flavis.

Loc. Habitat ſcrophulariam.

14. T. multi-faſciata.

La Mouche-à-ſcie à ventre rayé.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium omnibus flavis.

Loc.

15. T. cordata.

La Mouche-à-ſcie porte-cœur.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus anticis abdominiſque poſticâ parte ferrugineis.

Loc.

16. T. bimaculata.

La Mouche-à-ſcie à deux taches blanches au corcelet.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus anticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

17. T. ſtellata.

La Mouche à-ſcie noire à ventre bordé de taches jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculâ flavâ, ſegmentis abdominalibus utrinque maculis luteis.

Loc.

18. T. labiata.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes & corcelet variés de jaune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis maculis tribus abdominiſque apice flavis, pedibus flavo nigroque variis.

Loc.

19. T. multicolor.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes rouges & bandes du ventre fauves.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis abdominiſque apice maculis flavis, abdominis medio ſulvo, pedibus rubris.

Loc.

20. T. ſalicis.

La Bedeaude du ſaule.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. flava, capite thoraceque ſupra nigro.

Loc. Habitat ſalicem.

21. T. litterata.

La Mouche-à-ſcie à ventre & pattes fauves & corcelet panaché.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ⅓ lig.

T. capite thoraceque nigro caracteribus flavis, pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

22. T. albicornis.

La Mouche-à-ſcie à antennes blanches au bout.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, antennarum apice albo, abdominis baſi maculà utrinque albâ, apice fulvo.

Loc.

23. T. albipes.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes argentées.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra pedibus albo variegatis.

Loc.

24. T. liguſtrina.

La Mouche-à-ſcie à pattes argentées & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. nigra, femoribus maculis albis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

25. T. atra.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes fauves.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus ferrugineis.

Loc.

26. T. flavipes.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes jaunes & milieu du ventre fauve.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus flavis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

27. T. rufipes.

La Mouche-à-ſcie noire, à pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. ⅔ lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

28. T. dumetorum.

La Mouche-à-ſcie noire, à points de devant jaunes & milieu du ventre fauve.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, pedibus quatuor anticis flavis, femoribus poſticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

29. T. annulata.

La Mouche-à-ſcie noire, avec le milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, abdominis medio ferrugineo.

Loc.

30. T. cœruleſcens.

La Mouche-à-ſcie noire bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. tota nigro-cœrulea, alis nigricantibus, margine exteriore nigro.

Loc.

31. T. geniculata.

La Mouche-à-ſcie noire à genoux fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. nigra, geniculis ferrugineis.

Loc.

32. T. ceraſi.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes jaunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus flavis.

Loc.

33. T. pectinicornis.

La Mouche-à-ſcie noire, à antennes pectinées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, antennis uno verſu pectinatis, tibiis tarſiſque flavis.

Loc.

34. T. cordigera.

La Mouche-à-ſcie cordelière.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmento abdominali quinto albo, pedibus pallidis, genubus albis.

Loc.

* 35. T. Aſtroites.

L'Etoile d'or.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, humeris, thoracis apice, tibiiſque luteis.

Loc.

* 36. T. palmata.

La Mouche-à-ſcie aux pieds blancs.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, humeris thoraciſque apice flavis, pedibus abdominiſque medio ferrugineis, palmis poſticis albis.

Loc.

* 37. T. perlata.

La Mouche-à-ſcie perlée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, pedibus abdominiſque medio ferrugineis, palmis poſticis albo maculatis.

Loc.

38. T. apicaris.

La Mouche-à-ſcie fauve à point jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. ferruginea, thoracis apice flavo, oculis nigris.

Loc.

39. T. thoracica.

La Mouche-à-ſcie à pattes fauves & taches blanches.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus ferrugineis.

Loc.

FAMILIA II. *Antennis undecimnodiis.*

40. T. vernalis.

La Mouche-à-ſcie noire à corcelet rouge.

Long. 2 ½ lig. Larg. ¾ lig.

T. nigra, thorace rubro.

Loc.

41. T. virideſcens.

La Mouche-à-ſcie noire à ventre bordé de vert.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, pedibus, lateribus thoracis abdominiſque virideſcentibus.

Loc.

FAMIL. III. *Antennis octodecim-nodiis.*

42. T. cynoſbati.

La Mouche-à-ſcie à jambes variées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus ferrugineis, tibiis poſticis albo nigroque annulatis.

Loc.

43. T. rubi.

La Mouche-à-ſcie à point jaune au corcelet & milieu du ventre fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, puncto thoracis luteo, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

44. T. longicornis.

La Mouche-à-ſcie à longues antennes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, ſegmentis abdominalibus margine flavis, antennis duas tertias corporis partes æquantibus.

Loc.

* 45. T. longicollis.

La Mouche-à-ſcie à col allongé.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, utrinque luteo-maculata, collo elongato.

Loc.

* 46. T. ſertifera.

La Mouche-à-ſcie à bouquet.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, antennis utrinque pectinatis, pedibus flavis. *Maſc.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. tota ferruginea, antennis nigris thorace brevioribus ſubſerratis. *Femin.*

Loc.

* 47. T. prolongata.

La Mouche-à-ſcie à prolongement.

Long. 5, 6 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque medio fulvis collo elongato.

Loc.

LXXXVI. CYNIPS. *Le Cinips.*

Antennæ cylindraceæ fractæ.

Alæ inferiores breviores.

Os maxilloſum.

Aculeus ani conicus intra valvas abdominis.

Abdomen ſubovatum ad latera compreſſum, ſubtus acutum, petiolo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Famil. I. *Antennarum articuli undecim.*

1. C. bedeguaris.

Le Cinips doré à queue, du bedeguar liſſe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace viridi-æneo, abdomine aureo, ſetis ani corpore longioribus.

Loc. Habitat tumorem roſæ *Bedeguar* dictum, & gallam quercinam.

2. C. viridis.

Le Cinips doré ſans queue.

C. thorace viridi æneo, abdomine aureo, ſetis ani non exſertis.

Loc. Idem.

3. C. auratus.

Le Cinips porte-or.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. punctatus ſericeo-auratus, ſetis ani corpore brevioribus.

Loc.

4. C. fungoſus.

Le Cinips de la galle fongueuſe du chêne.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis, tibiis flavis, gallæ fungoſæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercinam.

5. C. pomaceus.

Le Cinips de la galle liſſe & ronde du chêne.

Long. 1 ½ lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuſcis, gallæ rotundæ, glabræ, duræ, foliorum quercûs.

Loc. Habitat minorem gallam foliorum quercûs, ſolitarius.

6. C. punctatus.

Le Cinips noirâtre à point marginal.

C. nigro-cupreus, pedibus fuſcis alarum puncto fuſco.

Loc.

7. C. foliaceus.

Le Cinips de la galle du chêne qui vient de la ſubſtance même de la feuille.

Long. 1 lig.

C. viridi-ſericeus, abdomine aurato, pedibus albis, gallæ intra foliorum quercûs ſubſtantiam deliteſcentis.

Loc. Habitat gallam intra foliorum quercûs laminas quaſi inſufflatam.

8. C. gemmæ quercûs.

Le Cinips de la galle en roſe du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuſcis, gallæ imbricatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs in roſæ formam expanſam & extus diſſectam.

9. C. baccarum quercûs.

Le Cinips de la galle en chapeau du chêne.

C. niger, pedibus fulvo flavis, gallarum fungiformium quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs pediculo foliis inhærentem, fungiformem.

10. C. fimbriatus.

Le Cinips de la galle platte & friſée du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-aureus, pedibus fuſco-variegatis, gallæ planæ rubræ fimbriatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs compreſſam, orbicularem, & fimbriatam.

11. C. racemoſus.

Le Cinips de la galle en grappe du chêne.

C. fuſcus nitens, capite nigro, abdominis apice villoſo, gallæ racemoſæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs duram in racemos ſuper foliorum pediculis diſpoſitam.

12. C. minutus.

Le Cinips de la galle tête d'épingle du chêne.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis nitens, pedibus pallidis gallæ globoſæ vix ſenſibilis foliorum quercûs.

Loc. Habitat gallam acutam & minutiſſimam quercûs.

13. C. ſcaber.

Le Cinips de la galle raboteuſe des feuilles de chêne.

C. gallæ ſcabræ foliorum quercûs.

Loc. Inſectum incognitum, Galla ſola noſcitur.

14. C. tuberculatus.

Le Cinips de la galle à tubercules du chêne.

C. gallæ tuberculatæ quercûs.

Loc. Idem.

15. C. numiſmalis.

Le Cinips de la galle en écuſſon de chêne.

C. gallæ numiſmatis quercûs.

Loc. Idem.

16. C. pedunculi quercûs.

Le Cinips de la galle en pomme des extrémités des branches du chêne.

C. gallæ pomiformis extremitatis ramorum quercûs.

Loc. Inſectum incognitum, Galla ſola noſcitur.

17. C. radicum.

Le Cinips de la galle ligneuſe des racines.

C. gallæ ligneæ radicum.

Loc. Idem.

18. C. ſalicis ſtrobili.

Le Cinips de la galle des feuilles de ſaule.

C. nigro-viridis nitens, pedibus pallidis, gallæ foliorum ſalicis.

Loc. Habitat gallam ſalicis folia veſtientem.

19. C. graminis.

Le Cinips de la galle à filets du chiendent.

C. gallæ graminis filamentoſæ.

Loc. Habitat gallam capillarem, quæ circà baſim foliorum graminis naſcitur.

20. C. glechomæ.

Le Cinips de la galle du lierre terreſtre.

C. totus fuſcus, thorace ſubvilloſo, gallæ hederæ terreſtris.

Loc. Habitat gallam duram & orbicularem folia glechomæ hederaceæ occupantem.

21. C. aurantii.

Le Cinips fauve & le ſauteur de l'oranger.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. aurantii, ferrugineus, alarum baſi albâ puncto nigro, antennis nigris, pedibus ſaltatoriis.

Loc.

22. C. ſaltator.

Le Cinips ſauteur noir.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger nitens, pedibus ſaltatoriis.

Loc.

23. C. cruciatus.

Le Cinips ſauteur noir à pieds fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. ater, pedibus ſaltatoriis fulvis.

Loc.

24. C. pupparum.

Le Cinips des chryſalides de papillons.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridi-ſericeus, abdomine aureo, pedibus pallidis, chriſalidum papilionum.

Loc. Habitat puppas papilionis braſſicæ.

25. C. ovulorum.

Le Cinips des œufs des inſectes.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

C. niger, pedibus pallidis, ovorum inſectorum.

Loc. Larva habitat ova papilionum, &c.

26. C. aphidum.

Le Cinips de l'ichneumon des pucerons.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger nitens, pedibus pallidis, ichneumonum aphidum.

Loc. Larva habitat aphides & ichneumonem aphidum.

* 27. C. biſaſciatus.

Le Cinips à bandes ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-viridis nitens, pedibus fuſcis, alarum faſciis duabus tranſverſis nigris.

Loc.

FAMIL. II. *Antennarum articuli ſeptem.*

28. C. foliorum.

Le Cinips des feuilles ſans galle.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

C. foliorum ſine gallâ, totus nigro-viridis nitens.

Loc. Larva vel chryſalis foliis adhæret.

29. C. gregarius.

Le Cinips du roſier, ſans galle.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. roſæ, ſine gallâ, totus niger.

Loc. Chryſalis fol. roſæ ſubtus adhæret.

30. C. circularis.

Le Cinips du chêne, ſans galle.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. quercûs ſine gallâ, totus viridi-aureus pedibus flavis.

Loc. Chryſalis fol. ilicis ſubtus adhæret.

31. C. eulophus.

Le Cinips à antennes rameuſes, ſans galle.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridis nitens, antennis ramoſis pallidis.

Loc. Chryſalis foliis tiliæ ſubtus adhæret.

32. C. tripunctatus.

Le Cinips à aîles pointillées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis nitens, alis punctis tribus nigris.

Loc.

33. C. antiquus.

Le Cinips vert bronzé à pattes blanches.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridis nitens, pedibus albido flavis.

Loc.

34. C. albipes.

Le Cinips noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 lig.

C. nigro nitens, pedibus pallidis.

Loc.

35. C. craſſipes.

Le Cinips brun à groſſes cuiſſes.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuſcus, femoribus clavatis.

Loc.

LXXXVII. DIPLOLEPIS. *Le Diplolèpe.*

Antennæ filiformes longæ articulis quatuordecim.

Alæ inferiores breviores.

Os maxilloſum.

Aculeus ani conicus intra valvas abdominis.

Abdomen ovatum, ad latera compreſſum, ſubtus acutum, petiolo brevi thoraci connexum.

1. D. quercus.

Le Diplolèpe de la galle ronde & dure du chêne.

Long. 1 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

D. fuſcus, gallæ, globoſæ, glabræ & duræ foliorum quercûs.

Loc. Habitat gallam rotundam & glabram inferioris foliorum quercûs ſuperficiei.

2. D. roſæ.

Le Diplolèpe du bedeguar.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

D. bedeguaris niger, abdomine ferrugineo apice nigro, pedibus rufis.

Loc. Habitat bedeguarem roſæ.

3. D. bedeguaris.

Le Diplolèpe de la galle fongueuſe & liſſe du roſier.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. bedeguaris levis fungoſi, fuſcus oculis nigris.

Loc. Idem.

4. D. niger.

Le Diplolèpe noir à ventre brun & antennes noires.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

D. niger, abdomine fuſco lucido, pedibus rufis, antennis nigris.

Loc.

5. D. fuſcus.

Le Diplolèpe brun à ventre luiſant & antennes brunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. fuſcus, abdomine lucido, pedibus rufis, antennis fuſcis.

Loc.

6. D. flavipes.

Le Diplolèpe à pattes jaunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. totus niger, pedibus flavis.

Loc.

LXXXVIII. ICHNEUMON. *L'ICHNEUMON.*

Antennæ filiformes, longæ vibratiles.
Alæ inferiores breviores.
Os maxilloſum.
Aculeus ani triplex.
Abdomen petiolo tenui longo thoraci connexum.
Ocelli tres.

1. I. globatus.

L'Ichneumon à coton blanc.

Long. 1 lig.

I. ſerico conglobato albo.

Loc. Habitat ſericum album herbis pratorum inhærentem.

2. I. glomeratus.

L'Ichneumon à coton jaune.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

I. ſerico conglobato flavo.

Loc. Habitat larvam papilionis braſſicæ.

3. I. alveariformis.

L'Ichneumon à coques en forme de rayons de ruche.

I. ſerico alveari-formi.

Loc. Habitat ſericum alveariformem.

4. I. aphidum.

L'Ichneumon des pucerons.

Long. 1 lig.

I. aphidum.

Loc. Larva aphides perforat & occidit, ipſam cynips terebrat.

5. I. manifeſtator.

L'Ichneumon à longue queue.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani corpore duplo longioribus.

Loc. Habitat ſylvas.

6. I. ſetoſus.

L'Ichneumon noir à queue de la longueur du corps & ventre liſſe.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani longitudine corporis, abdomine levi.

Loc. Habitat arbores.

7. I. tuberculatus.

L'Ichneumon à queue de la longueur du corps & ventre à tubercules.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani longitudine corporis, abdomine tuberculis lateralibus.

Loc. Idem.

8. I. compunctor.

L'Ichneumon à pattes fauves & courte queue.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani corpore triplo brevioribus, abdomine fere ſeſſili.

Loc. Habitat chryſalides papilionum.

9. I. petiolatus.

L'Ichneumon à pattes fauves & ventre en filet.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani corpore triplo brevioribus, abdominis baſi tenui longa petiolatu.

Loc.

10. I. frontalis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & devant de la tête jaune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, fronte flava.

Loc.

11. I. femoralis.

L'Ichneumon noir à pattes brunes & groſſes cuiſſes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus poſticis craſſis globoſis.

Loc. Habitat vitra domorum.

12. I. ruſpator.

L'Ichneumon à pattes brunes & groſſes cuiſſes dentelées.

Long. 3 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus poſticis craſſis denticulo armatis.

Loc.

13. I. geniculatus.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & genoux blancs.

Long. 5 lig. Larg. ⅔ lig.

I. niger, pedibus rufis, genibus annulo albo.

Loc.

14. I. inguinalis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & point blanc à la baſe des cuiſſes.

Long. 5 lig. Larg. ⅔ lig.

I. niger, pedibus rufis, femorum baſi puncto albo.

Loc.

15. I. albipes.

L'Ichneumon noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus albidis, alarum puncto nigro.

Loc. Habitat flores cirſii.

16. I. jaculator.

L'Ichneumon tout noir à pattes poſtérieures très-longues & groſſes.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. totus niger, tibiis poſticis clavatis abdomine longo, tenui, falcato.

Loc.

17. I. annularis.

L'Ichneumon noir à pattes poſtérieures groſſes & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, tibiis poſticis clavatis, abdomine tenui falcato circa medium fulvo.

Loc.

18. I. craſſipes.

L'Ichneumon noir à pattes fauves très-groſſes & tachetées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, femoribus poſticis craſſiſſimis fulvis puncto albido.

Loc.

19. I. falcatus.

L'Ichneumon noir à pattes fauves, à cuiſſes poſtérieures groſſes & ventre en faucille.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, tibiis rufis, femoribus poſticis clavatis, abdomine longo falcato.

Loc.

20. I. crocatus.

L'Ichneumon jaune à tête & corcelet noirs avec la pointe jaune.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. luteus, capite thoraceque fuſco apice flavo.

Loc.

21. I. luteus.

L'Ichneumon jaune à ventre en faucille.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. luteus totus.

Loc.

22. I. melanocephalos.

L'Ichneumon à tête & corcelet noirs, & à ventre jaune en faucille.

Long. 9 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. capite thoraceque nigris, antennis pedibus abdomineque falcato, luteis.

Loc.

23. I. ramidulus.

L'Ichneumon jaune à corcelet noir en deſſous & extrémité du ventre noire.

Long. 8 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. luteus, oculis, thorace infra, abdominiſque falcati apice nigris.

Loc.

24. I. pugillator.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre citron.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine falcato, pedibus abdominiſque medio flavis.

Loc.

25. I. virgatus.

L'Ichneumon jaune à corcelet rayé.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. luteus, thoracis faſciis tribus longitudinalibus fuſcis.

Loc. Habitat ilicem.

26. I. obſcurus.

L'Ichneumon brun à tête & bout du ventre noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuſcus, capite adominiſque apice nigris.

Loc.

27. I. apicarius.

L'Ichneumon jaune à pointe du corcelet noire.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. flavo-ferrugineus, apice thoracis nigro.

Loc.

28. I. ſcutellatus.

L'Ichneumon fauve à taches noires & pointe du corcelet jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. flavo, rufo, nigroque variegatus, thoracis apice flavo.

Loc. Habitat larvas papilionum.

29. I. melanopteros.

L'Ichneumon brun à taches noires & aîles noirâtres.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuſcus, nigro maculatus, alis nigris.

Loc.

30. I. linearis.

L'Ichneumon fauve à taches noires & aîles croiſées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. linearis rufus nigro maculatus, alis albis cruciatis.

Loc.

31. I. punctatus.

L'Ichneumon noir à petites taches jaunes.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte punctiſque humerorum flavis.

Loc.

32. I. citratus.

L'Ichneumon noir à ventre tacheté de citron ſur les côtés.

Long. $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. atro-cœruleſcens, abdominalibus ſegmentis utrimque maculâ flavâ.

Loc.

33. I. binarius.

L'Ichneumon noir chagriné à pattes ſauves & deux taches jaunes ſur le ventre.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, punctatus, pedibus rufis, abdominis baſi utrinque maculâ flavâ.

Loc.

34. I. tertiarius.

L'Ichneumon noir à cuiſſes poſtérieures fauves & deux taches blanches ſur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, femoribus poſticis rufis abdominis medio utrinque maculâ albâ.

Loc.

35. I. multicolor.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à corcelet & ventre tacheté de blanc.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, thoracis baſi linea, apice puncto, alois abdominis ſegmento 1°. punctis duobus, 2°. margine albis.

Loc.

36. I. globulifer.

L'Ichneumon noir à plaque de poils bruns ſur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, alis extremo fuſcis, abdominis apice villoſo ferrugineo.

Loc. Habitat larvas phalænarum.

37. I. bifaſciatus.

L'Ichneumon noir à deux bandes ſur les aîles.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, alis faſciâ duplici tranſverſâ nigrâ.

Loc.

38. I. niger.

L'Ichneumon tout noir.

Long. 1 lig.

I. totus niger.

Loc.

39. I. comitator.

L'Ichneumon noir à anneaux blancs aux antennes.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. totus niger, antennis medio albis.

Loc. Larva habitat nidum veſparum.

40. I. funereus.

L'Ichneumon noir, avec la pointe du corcelet & le milieu des antennes blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, thoracis apice antennarumque medio albis.

Loc.

41. I. dumetorum.

L'Ichneumon noir à cuiſſes rougeâtres & anneau blanc aux antennes.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, femoribus teſtaceis, antennis medio albis.

Loc. Habitat dumeta.

42. I. ſpiralis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres & anneau blanc aux antennes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, tibiis poſticis apice nigris, antennis medio albis.

Loc.

43. I. punctulatus.

L'Ichneumon à points.

Long. 6 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus abdominiſque anticâ parte ſuperne rufis, antennis medio albis.

Loc.

44. I. tibialis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à taches blanches ſur les jambes & anneau blanc aux antennes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, tibiis antenniſque medio albis.

Loc.

45. I. tarſoſus.

L'Ichneumon à pattes rougeâtres avec le milieu des tarſes & des antennes blanc.

Long. 4 lig.

I. niger, pedibus rufis, tarſis poſticis antenniſque medio albis.

Loc.

46. I. articulatus.

L'Ichneumon noir, à pattes rougeâtres, avec les genoux & le milieu des antennes blancs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, geniculis antennarumque medio albis.

Loc.

47

47. I. abdominalis.

L'Ichneumon noir à ventre & jambes fauves, & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

I. niger, abdomine toto ferrugineo antennis annulo albo.

Loc.

48. I. ani.

L'Ichneumon noir à ventre fauve vers le bas & anneau blanc aux antennes.

Long. 6 ½ lig.

I. niger, abdomine pone ferrugineo antennis medio albis.

Loc.

49. I. upſalienſis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 lig. Larg. ½ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo apice nigro, antennis annulo albo.

Loc.

50. I. tripunctatus.

L'Ichneumon noir à bande fauve ſur le ventre avec la pointe du corcelet & anneau des antennes blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, abdomine antice ferrugineo, poſtice nigro punctis tribus albis, thoracis apice annuloque antennarum albo.

Varietas A. I. femoribus omnibus nigris.

B. I. femoribus nigris, tibiiſque omnibus baſi albis, apice nigris.

Loc. Habitat ſylvas.

51. I. dictator.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à anneaux blancs aux pattes & aux antennes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, tibiis antenniſque annulo albo.

Loc.

52. I. peregrinator.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant, noir poſtérieurement & terminé de blanc, & à anneau blanc aux antennes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. abdomine ferrugineo, pone nigro, apice albo; antennis medio albis.

Loc.

53. I. vorax.

L'Ichneumon panaché de noir & citron à anneau blanc aux antennes.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, thoracis apice, abdominis medio pedibuſque flavo variegatis, antennis medio albis.

Loc.

54. I. palmarius.

L'Ichneumon à pointe du corcelet blanche & pattes panachées de blanc.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoraciſque apice albis, tibiis palmiſque albo variegatis.

Loc.

55. I. conſtellatus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet & taches du ventre blanches.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thoracis apice maculiſque abdominis quauor albis, antennarum medio albo.

Loc.

56. I. fuſcipes.

L'Ichneumon noir à pieds rougeâtres & pointe du corcelet blanche.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, apice thoracis albo.

Loc.

57. I. ſcirpi.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet & bout du ventre blancs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thoracis abdominiſque apice albo.

Loc. Larva habitat ſcirpum paluſtrem.

58. I. junci.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet jaune avec les pattes & le milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, fronte thoraciſque apice flavis, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat juncum.

59. tiphæ.

L'Ichneumon noir à antennes pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig.

I. niger, fronte flavâ, antennis pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat tipham.

60. I. compreſſus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet, partie des pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 4 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, fronte, thoracis apice, tibiis ex parte abdominiſque medio flavis.

Loc.

61. I. marginalis.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet jaune & partie antérieure du corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, thoracis apice flavo, humeris pedibuſque ferrugineis, ſegmentis abdominalibus margine albidis.

Loc.

62. I. interſectus.

L'Ichneumon arlequin.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoracis apice pedibus abdomineque ſupra flavis, thorace flavo maculato.

Loc.

63. I. curtatus,

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & court pédicule.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice fulvo, petiolo brevi.

Loc.

63. I. Friſchii.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à long pédicule.

Long. 10 lig. Larg. 1 ¾ lig.

I. niger, abdomine fulvo, poſtice nigro petiolo longiſſimo.

Loc.

65. I. conſtrictus.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & tarſes antérieurs blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice rufo, poſtice nigro, palmis anticis albis.

Loc.

66. I. nemoralis.

L'Ichneumon noir à ventre fauve au milieu & pieds de derrière blancs.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdominis medio pedibuſque anterioribus rufis, palmis poſticis albis.

Loc.

67. I. trochantericus.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre fauves, & pieds de derrière noirs.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdominis medio, pedibuſque rufis, palmis poſticis nigris.

Loc.

68. I. ſcanicus.

L'Ichneumon noir à pattes poſtérieures panachées.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, tibiis poſticis albo nigroque variegatis.

Loc. Habitat ſylvas.

69. I. Plæſſeus.

L'Ichneumon à anneaux du ventre rougeâtres & pattes poſtérieures panachées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ſegmentorumque abdominis margine ferrugineis, tibiis poſticis albo nigro fulvoque variegatis.

Loc.

70. I. coccineus.

L'Ichneumon noir à ventre couleur de ceriſes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine coccineo.

Loc. Habitat ſylvas.

71. I. rubicundus.

L'Ichneumon noir à corcelet & ventre rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, thorace abdomineque rubris.

Loc.

72. I. cruentatus.

L'Ichneumon à corcelet tacheté de rouge en devant.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger punctatus, capite thoraceque antice rubro maculatis, pedibus fuſcis.

Loc.

73. I. fumoſus.

L'Ichneumon noir à pattes & corcelet en devant de couleur brune.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger lævis, thorace antice pedibuſque fuſcis.

Loc. Larva devorat ova aranearum.

74. I. ſeſſilis.

L'Ichneumon noir avec les deux anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les aîles noires.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, abdomine ſubſeſſili ſegmentis duobus anticis rufis, alis nigricantibus.

Loc.

75. I. viaticus.

L'Ichneumon noir avec les trois anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les aîles noires.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, abdomine ſubſeſſili ſegmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus.

Loc. Habitat larvas papilionum quas in terram deponit.

76. I. ochrocephalos.

L'Ichneumon noir à ventre & tête jaunes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. nigro, abdomine capiteque flavis alis nigricantibus.

Loc.

77. I. poſticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie ſupérieure du ventre rougeâtres.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus abdominiſque poſticâ parte ferrugineis.

Loc.

78. I. anticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie antérieure du ventre rougeâtres.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, pedibus abdominiſque anticâ parte ferrugineis.

Loc.

79. I. labialis.

L'Ichneumon noir à ventre & pattes fauves & lèvre jaune.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger fronte flavâ, pedibus ferrugineis, abdomine rufo apice nigro.

Loc.

80. I. teniola.

L'Ichneumon noir à long filet, à pattes & partie antérieure du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger fronte flavâ, pedibus ferrugineis, abdomine rufo, poſtice nigro, petiolo tenui longo.

Loc.

81. I. inculcator.

L'Ichneumon noir à pattes & ventre fauves.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

82. I. urticæ.

L'Ichneumon noir à antennes, pattes & ventre fauves.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, antennis pedibus abdomineque ferrugineo-fuſcis, ſetis ani corpore paulo longioribus.

Loc.

83. I. cepæ.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 3 lig.

I. niger, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc Habitat cepam, porrum, allia.

84. I. pupparum.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures pâles, poſtérieures & milieu du ventre fauves.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus anticis pallidis, femoribus poſticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Habitat puppas papilionum.

85. I. inverſus.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures citronnées & ventre fauve en deſſous.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus quatuor anticis luteis, abdomine ſubtus fulvo.

Loc.

86. I. cinctus.

L'Ichneumon à deux bandes ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, alis albis, faſciâ duplici nigrâ, poſteriore majore.

Loc. Habitat vitra domorum.

87. I. extenſor.

L'Ichneumon brun à filet.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. linearis, antennis longitudine corporis tentaculis ſetaceis, femoribus clavatis.

Loc. Idem.

88. I. albus.

L'Ichneumon blanc.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. linearis albus, fuſco maculatus, abdominis petiolo tenui longo.

Loc. Habitat folia quercûs, rarus.

89. I. acicularis.

L'Ichneumon à aiguillette.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

I. linearis fuſcus, capite abdominiſque apice nigris, antennis corpore longioribus.

Loc.

90. I. aranearum.

L'Ichneumon à anneaux ſur le ventre & femelle ſans aîles.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus abdominiſque annulo duplici ferrugineis. *Maſc.*

I. apterus fulvus, capite antennarum apice abdominiſque faſciâ duplici tranſverſâ nigris. *Femina.*

Loc. Habitat nidos aranearum.

91. I. carpini.

L'Ichneumon à pattes variées de fauve & femelle ſans aîles.

Long. 1 lig.

I. niger, pedibus rufis geniculis fuſcis; fæminâ apterâ.

Loc. Habitat dumeta.

92. I. apterus.

L'Ichneumon noir à pattes & baſe des antennes fauves & femelle ſans aîles.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. niger, pedibus antennarumque baſi ferrugineis; fæminâ apterâ.

Loc.

93. I. bedeguaris.

L'Ichneumon du bedeguar.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

I. bedeguaris niger, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Habitat bedeguarem roſæ.

94. I. vittatus.

L'Ichneumon à bande jaune.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. fulvus, antennis pedibuſque nigris, alis atris faſciâ tranſverſâ luteâ.

Loc.

* 95. I. ruſticus.

L'Ichneumon à pattes fauves & pieds noirs.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig

I. niger, pedibus rufis, ſetis ani corpore duplo brevioribus, tibiis poſticis nigris.

Loc.

* 96. I. quadripes.

L'Ichneumon chauſſé de blanc.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdomine falcato, palmis quatuor anticis albis.

Loc.

* 97. I. baſilaris.

L'Ichneumon baſilaire.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, humeris thoracis apice pedibus abdominiſque baſi flavo maculatis, antennis medio albis.

Loc.

* 98. I. poplitæus.

L'Ichneumon à jarretières.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, pedibus geniculis albis, antennis annulo albo.

Loc.

* 99. I. cœleſtis.

L'Ichneumon céleſte étoilé.

Long. 7 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo baſi nigrâ, tibiis fulvis thoracis apice antennarumque medio albis.

Loc.

* 100. I. flavipes.

L'Ichneumon à ventre fauve & pattes jaunes.

Long. 4 lig. Long. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo pedibus flavis.

Loc.

* 101. I. arlequinatus.

L'Ichneumon à pattes arlequinées.

Long. 3 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

I. niger, ſegmentis abdominalibus margine fulvis, pedibus ferrugineis annulis albis.

Loc.

* 102. I. ſignatus.

L'Ichneumon à raies blanches.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. fulvus, capite thoraceque ſupra nigris, albis ſetis corpus æquantibus.

Loc.

* 103. I. ſegmentoſus.

L'Ichneumon à baſe du ventre rouge.

Long. 4, 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$, 1 lig.

I. ater, alis nigris ſegmentis abdominalibus 1°, 2° & 3° rubris margine luteis.

Loc.

* 104. I. petiolatus.

L'Ichneumon à bande tranſverſe.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

I. fulvo fuſcoque variegatus, abdominis petiolo tenui, alis faſciâ tranſversâ fuſcâ.

Loc.

* 105. I. faſciatus.

L'Ichneumon faſcié.

Long. 9 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, antennis pedibuſque flavis, ſegmentis abdominalibus margine luteis.

Loc.

106. I. bipartitus.

L'Ichneumon à ventre mi-parti.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, antennarum medio, thoracisque apice flavis, pedibus fulvis, abdomine antice fulvo faſciâ nigrâ, poſtice nigro faſciâ flavâ.

Loc.

LXXXIX. VESPA. *LA GUEPE.*

Antennæ fractæ, articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores.

Os maxilloſum, lingua membranacea inflexa.

Aculeus ani ſimplex ſubulatus.

Abdomen petiolo breviſſimo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Corpus glabrum.

1. V. crabro.

La Guêpe-frelon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

V. thorace nigro, antice rufo immaculato, abdominis inciſuris puncto nigro duplici contiguo.

Loc. Nidificat in truncis cavis arborum.

2. V. vulgaris.

La Guêpe commune.

Long. 8 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

V. thorace lineolis trium parium differentium flaveſcentium *

* Punctis inciſurarum nullis. *Maſc.*

* Punctis nigris inciſurarum liberis. *Fœmina.*

Varietas A. V. thorace lineolis trium parium differentium flaveſcentium, punctis nigris inciſurarum connexis.

B. V. thorace lineolis quatuor parium differentium flaveſcentium, punctis nigris inciſurarum connexis.

C. V. thorace lineolis quinque parium differentium flaveſcentium, punctis nigris inciſurarum connexis.

D. V. thorace lineolis duorum parium differentium flaveſcentium, punctis nigris inciſurarum connexis.

Loc. Habitat domos.

3. V. arvenſis.

La Guêpe à anneaux bordés de noir.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

V. nigra, abdomine flavo, ſegmentis margine nigris.

Varietas A. V. nigra, thorace punctis octo luteis, ſingulis ſegmentis abdominalibus faſciis tranſverſis luteis, primis interruptis.

B. V. nigra, thorace punctis decem luteis, ſingulis ſegmentis abdominalibus faſciis tranſverſis luteis.

C. V. nigra, thoracis baſi lineolis duabus flavis apice lineâ flavâ, ſingulo ſegmento abdominali faſciâ tranſversâ luteâ, ſecundâ & tertiâ interruptâ.

D. V. nigra, thoracis baſi lineolis duabus flavis, apice lineâ flavâ, ſingulo ſegmento abdominali faſciâ tranſversâ luteâ, quatuor primis interruptis.

E. V. nigra, thoracis baſi lineolis duabus flavis, apice lineâ flavâ, ſingulo ſegmento abdominali excepto 1° & 3°, faſciâ tranſversâ luteâ.

Loc. Habitat arva.

4. V. faſciata.

La Guêpe à anneaux bordés de jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

V. nigra, ſegmentis abdominalibus margine flavis.

Loc. Habitat flores in hortis.

5. V. bimaculata.

La Guêpe à anneaux bordés de jaune, & deux taches jaunes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ⅓ lig.

V. nigra, thoracis maculis quindecim flavis, ſegmentis abdominalibus margine luteis, ſecundo maculâ utrinque flavâ.

Loc. Habitat alveos confertim petiolis arborum adhærentes.

6. V. longicornis.

La Guêpe à longues antennes, & quatre bandes noires ſur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V

V. thorace nigro maculis flavis, abdomine flavo, faſciis quatuor nigris, antennis longis.

Loc.

7. V. infundibuliformis.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & trois bandes jaunes.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine faſciis tribus flavis, tertiâ remotiſſimâ, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

8. V. globuloſa.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & cinq bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, abdomine faſciis quinque flavis, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

9. V. parietum.

La Guêpe à cinq bandes jaunes ſur le ventre, la première éloignée des autres.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine faſciis quinque flavis, primâ remotiſſimâ.

Loc. Habitat parietes.

10. V. coarctata.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire, & le ſecond en cloche.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdominis articulo primo infundibuliformi, ſecundo campanulato maximo.

Loc. Habitat nidum terreum ericis inhærentem.

11. V. ordinata.

La Guêpe noire à raies de points jaunes ſur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine punctorum flavorum ordine quadruplici longitudinali.

Loc.

12. V. quadri-punctata.

La Guêpe noire à premier anneau du ventre bordé de jaune avec deux points ſur le ſecond & le troiſième.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis ſegmento primo margine flavo, ſecundo & tertio puncto duplici luteo.

Loc.

13. V. guttata.

La Guêpe noire à quatre points blancs ſur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis ſegmentis primo & ſecundo utrinque puncto albo, pedibus ferrugineis.

Loc.

14. V. pratenſis.

La Guêpe noire à lèvre ſupérieure & baſe du corcelet jaunes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, fronte, thoracique baſi flavis.

Varietas A. V. nigra, fronte flava.

Loc. Habitat flores.

15. V. femoralis.

La Guêpe noire à cuiſſes poſtérieures fort groſſes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, femoribus poſticis globoſis ſerratis, tibiis arcuatis alarum, baſi genubuſque flavis.

Loc. Idem.

16. V. dearticulata.

La Guêpe deginguendée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

V. femoribus poſticis craſſis, globoſis, ſerratis, denticulo donatis; abdominis globoſi petiolo tenui longo.

Loc. Habitat aquatica loca.

17. V. nigra.

La Guêpe noire.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. tota nigra cœruleſcens.

Loc.

18. V. rubra.

La Guêpe rouge à bandes noires ſur le corcelet & points jaunes ſur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. rubra, thorace lineolis longitudinalibus nigris, abdomine maculis flavis.

Loc.

19. V. ſinuata.

La Guêpe ſinuée.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, thoracis baſi lineâ viridi, abdomine faſciis quatuor undulatis viridibus, primâ interruptâ.

Loc.

* 20. V. interſecta.

La Guêpe entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace faſciis quatuor baſi & apice lineis flavis, abdomine faſciis ſeptem undulatis flavis interruptis.

Loc.

* 21. V. petiolata.

La Guêpe à cordons.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, thoracis baſi & apice flavis, abdomine petiolato faſciis tribus luteis, tertiâ remotiſſimâ.

Loc.

* 22. V. fulvipes.

La Guêpe à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace punctis quatuor luteis, ſegmentis abdominalibus faſciis luteis, primis duabus interruptis.

Loc.

23. V. capitata.

La Guépe à groſſe tête.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, abdomine faſciis luteis, capite quadrato thorace latiori.

Loc.

24. V. carbunculus.

La Guépe dorée à corcelet mi-parti de rouge & de vert.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

V. viridi-cœrulea, abdomine thoraciſque anticâ parte ruberrimis.

Loc.

25. V. ignita.

La Guépe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre épineux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. thorace viridi cœruleo, abdomine inaurato, pone cupreo dentato.

Loc. Habitat lapidum intervalla.

26. V. aurata.

La Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre liſſes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. thorace viridi-cœruleo, abdomine aurato-cupreo, pone inermi.

Loc. Idem.

27. V. cuprea.

La Guêpe dorée bleue.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. cœrulea nitens.

Loc.

28. V. viridis.

La Guêpe dorée verte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V. viridis nitens.

Loc.

29. V. rufeſcens.

La Guêpe dorée cuivreuſe à ventre fauve & noir.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V. capite thoraceque rubro cupreo, abdomine rufo pone nigro.

Loc.

XC. APIS. *L'Abeille.*

Antennæ fractæ articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores.

Os maxilloſum, linguâ membranaceâ inflexâ.

Aculeus ani ſimplex ſubulatus.

Abdomen petiolo breviſſimo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Corpus villoſum.

Familia I. *Corpore villoſo, apis proprie dicta.*

1. A. mellifera.

L'Abeille domeſtique ou des ruches.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. gregaria.

Loc.

2. A. nitida.

L'Abeille brune à ventre liſſe & pattes velues.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. ſubhirſuta fuſca, abdomine nitido pedibus villoſis.

Loc.

3. A. manicata.

L'Abeille à cinq crochets.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig

A. abdomine faſciis flavis interruptis; apice ſpinâ quintuplici recurvâ armato.

Loc. Habitat flores.

4. A. parietina.

L'Abeille maçonne à poils roux.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, thorace abdominiſque baſi ſuperne lanâ rufâ.

Loc. Habitat parietes euro oppoſitos.

5. A. centuncularis.

L'Abeille charpentière à ventre velu & roux en deſſous.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, abdomine ſupra lineis albis ſubtus lanâ flavâ.

Loc. Habitat lignum, arbores exæſas.

6. A. hirta.

L'Abeille fauve à ventre cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, hirſutie-flava, abdomine ſupra glabro nitente cupreo.

Loc.

7. A. fodiens.

L'Abeille mineuſe à corcelet roux & velu.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, thorace hirſuto fulvo, abdomine glabro inciſuris albis.

Loc. Terram fodit.

8. A. cinerea.

L'Abeille griſe.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra hirſutie cinerea.

Loc. Habitat terræ ſectiones verticales.

9. A. inciſa.

L'Abeille griſe à lèvre jaune & à houppe aux pattes du milieu.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, hirſutie cinerea, fronte flavâ inciſuris abdominalibus albis.

Loc.

10. A. longicornis.

L'Abeille à longues antennes.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. hirſutie flaveſcens, fronte flavâ, antennis articulatim compreſſis corpus æquantibus.

Loc.

11. A. terreſtris.

L'Abeille à lèvre jaune & anneaux du ventre blanchâtres.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. ſubhirſuta cinerea, abdomine nigro, ſegmentis albidis, fronte flaveſcente.

Loc. Terram fodit horiſontaliter.

12. A. agreſtis.

L'Abeille à lèvre & pattes jaunes & anneaux du ventre fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. hirſutie cinerea, pedibus labioque ſuperiore flaveſcentibus; abdomine glabro nigro inciſuris rufis.

Loc.

13. A. hortenſis.

L'Abeille à pattes jaunes & anneaux du ventre blancs.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

A. hirſuta, pedibus croceis, abdomine nigro, inciſuris albis.

Loc. Habitat flores in hortis.

14. A. crocipes.

L'Abeille à pattes jaunes & ventre un peu cuivreux.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, pedibus croceis, abdomine leviter cupreo.

Loc. Idem.

15. A. cuprea.

L'Abeille verdâtre & cuivreuſe.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. tota viridi-cuprea.

Loc.

16. A. muraria.

L'Abeille bleuâtre à aîles nébuleuſes.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigro-cœruleſcens, alis nebuloſis, fronte femoribuſque poſticis hirſutie flavis.

Loc. Nidificat in vetuſtis muris.

17. A. rufeſcens.

L'Abeille noire à ventre brun & liſſe.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, apice nigro.

Loc.

18. A. obſcura.

L'Abeille noire à ventre brun & anneaux noirs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, inciſuris nigris.

Loc.

* 19. A. interrupta.

L'Abeille à houppes blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

A. nigra, ſegmentis abdominalibus faſciis albis, piloſis interruptis, alis nigris punctis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Corpore hirſutiſſimo, apis bombilius.*

20. A. violacea.

L'Abeille perce-bois.

Long. 10 lig. Larg. 3 ½ lig.

A. hirſuta atra, alis violaceis.

Loc. Habitat ligna exæſa.

21. A. ſubterranea.

L'Abeille noire à ventre brun vers l'extrêmité.

A. hirſuta atra, ano fuſco.

Loc. Terram fodit.

22. A. lapidaria.

L'Abeille noire avec les derniers anneaux du ventre fauves.

A. hirſuta atra, ano fuſco.

Loc. Habitat lapidem.

23. A. coronata.

L'Abeille noire à couronne du corcelet citron, & extrémités du ventre fauves.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. nigra, fronte baſique thoracis flavis, ano fulvo.

Loc.

24. A. regalis.

L'Abeille noire à couronne du corcelet & haut du ventre citron & l'extrémité du ventre fauve.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. nigra, thoracis abdominiſque baſi flavâ, ano fulvo.

Varietas. A. flava, abdominis medio nigro, ano fulvo.

Loc.

25. A. virginalis.

L'Abeille à couronne du corcelet & haut du ventre citron, & l'extrémité du ventre blanche.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

A. nigra, thoracis abdominiſque baſi flavâ, ano fulvo.

Loc.

26. A. hypnorum.

L'Abeille à couronne & extrêmités du corcelet & haut du ventre citron, & l'extrémité du ventre blanche.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

A. nigra, thoracis baſi & apice, abdominiſque baſi flavis, ano albo.

Loc.

27. A. veſtalis.

L'Abeille à couronne du corcelet citron & extrémité du ventre mi-partie de citron & de blanc.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

A. nigra, thoracis baſi flavâ, ano ſupra flavo, apice albo.

Loc.

28. A. ruſtica.

L'Abeille noire à ventre fauve.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, abdomine fulvo.

Loc.

29. A. muſcorum.

L'Abeille fauve à ventre jaune & extrémité fauve.

Long. 5 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. thorace fulvo, abdomine fulvo, ano fulvo.

Loc. Nidum pilis intus paleis extus ædificat.

XCI. FORMICA. *LA FOURMI.*

Antennæ fractæ, articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores, neutris nullæ.

Os maxilloſum.

Abdomen petiolo brevi thoraci connexum cum ſquamâ intermediâ.

Ocelli tres.

1. F. ſuſcoptera.

La grande Fourmi à aîles à moitié brunes.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

F. nigra, alarum dimidio fuſco.

Loc. Habitat ſylvas.

2. F. flavipes.

La Fourmi noire à antennes & pattes jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. nigra, antennis pedibuſque flavis.

Loc. Habitat hortos.

3. F. maculata.

La Fourmi brune à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. fuſca, pedibus rufis, thorace maculâ flavâ.

Loc. Idem.

4. F. rufa.

La Fourmi brune à corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fuſca, thorace fulvo.

Loc. Idem.

5. F. fuſca.

La Fourmi toute brune.

Long. $2\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fuſca.

Loc.

6. F. nigra.

La Fourmi toute noire.

Long. $1\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

F. atra.

Loc.

SECTIO QUINTA.

INSECTA DIPTERA.

XCII. OESTRUS. *L'Oestre.*

Antennæ ſetaceæ è globulo prodeuntes.
Os nullum, puncta tantum tria.
Ocelli tres.

1. O. hæmorrhoidalis.
L'Oeſtre du fondement des chevaux.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig.
O. villoſus, pallido-flaveſcens, abdominis medio cingulo nigro, apice fulvo.
Loc. Larva habitat inteſtinum rectum equi.

2. O. ovis.
L'Oeſtre des moutons.
Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.
O. cinereus, nigro maculatus & punctatus.
Loc. Larva habitat ſinum frontalem ovium.

3. O. bovis.

L'Oeſtre des bœufs.

O. thorace flavo, cingulo nigro; alis nigrâ faſciâ, pedibus pallidis.

Loc. Larva habitat cutem boum.

XCIII. TABANUS. *LE TAON.*

Antennæ ſetaceo conicæ è quatuor partibus.

Os proboſcide dentibuſque conniventibus.

Ocelli tres.

1. T. bovinus.

Le Taon à ventre jaunâtre & taches triangulaires blanches.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

T. thorace cinereo; abdomine flaveſcente ſegmentis ſingulis triangulo albo.

Loc. Idem.

2. T. triangularis.

Le Taon gris à taches blanches triangulaires ſur le ventre.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinereus thorace faſciis longitudinalibus albis, abdominis ſegmento ſingulo triangulo maculiſque albis.

Loc. Habitat prata.

3. T. albipes.

Le Taon brun à jambes blanchâtres.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. fuſcus, tibiis albido-pallidis.

Loc. Idem.

4. T. dichotomus.

Le Taon noir à antennes fourchues.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. totus niger, antennis diochotomis.

Loc. Idem.

5. T. pluvialis.

Le Taon à aîles brunes piquées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. fuſcus, alis cinereis punctis minutiſſimis albis.

Loc. Idem.

6.

6. T. interſectus.

Le Taon noir à anneaux du ventre bordés de blanc.

Long. 5 lig. Larg. 1. lig.

T. niger, thorace lineis duabus longitudinalibus cinereis, abdominis ſegmentis limbo cinereo.

Loc. Habitat ſylvas.

7. T. bromius.

Le Taon gris à jambes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, tibiis flavis.

Loc.

8. T. cœcutiens.

Le Taon brun à côtés du ventre jaunes & aîles tachetées de noir.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. fuſcus, abdominis lateribus pedibuſque flavis, alis maculis flavis.

Loc.

9. T. lateralis.

Le Taon brun à côtés du ventre jaunes & aîles blanches.

T. fuſcus, abdominis lateribus pedibuſque flavis, alis immaculatis albis.

Loc.

10. T. biſaſciatus.

Le Taon à deux bandes noires ſur les aîles.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. fuſcus abdomine antice luteo, alarum margine exteriore, faſciiſque duabus tranſverſis nigris.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

11. T. marmoratus.

Le Taon à une ſeule bande panachée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, abdomine flavo maculis triangularibus nigris, alarum margine exteriore, faſciâque tranſversâ marmoratâ fuſcâ.

Loc. Habitat prata.

XCIV. ASILUS. *L'Asile.*

Antennæ ſetaceo-conicæ quadripartitæ.

Os roſtro ſubulato acuto.

Ocelli tres.

1. A. lanigerus.

Le Bichon.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

A. lanigerus, alarum baſi fuſcâ.

Loc. Habitat flores.

2. A. fulvus.

L'Aſile velu de couleur.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

A. hirſutus ferrugineus, alis fulvis femoribus nigris.

Loc. Habitat prata.

3. A. crabroniformis.

L'Aſile brun à ventre à deux couleurs.

Long. 1 pouce. Larg. 2 ½ lig.

A. ferrugineus, abdominis articulis tribus prioribus atris, poſterioribus quatuor flavis.

Loc. Habitat prata humida.

4. A. gilvus.

L'Aſile noir à tache fauve ſur le ventre.

Long. 10 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger, abdominis ſegmentis tribus à tergo rufis.

Loc. Idem.

5. A. ater.

L'Aſile tout noir.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. totus niger, ſubhirſutus, alis atris.

Loc. Habitat ripas amnium.

6. A. undulatus.

L'Aſile noir velu à pattes & balanciers fauves & aîles noires ondées.

Long. 7 lig. Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger hirſutus, tibiis halteribuſque ſerrugineis, alis nigro undulatis.

Loc. Habitat prata.

2. A. marmoratus.

L'Aſile noir liſſe, à antennes, cuiſſes & balanciers fauves & aîles ondées de brun.

Long. 7 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger glaber, antennis, femoribus, halteribus, tibiiſque ſecundi & poſtici paris rufis, alis fuſco undulatis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

3. A. ælandicus.

L'Aſile noir liſſe à pattes & balanciers fauves, & aîles toutes noires.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribuſque ferrugineis, alis nigris.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

9. A. venoſus.

L'Aſile noir liſſe, à pattes & balanciers fauves & aîles blanches veinées.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribuſque ferrugineis, alis albis venis nigris.

Loc. Habitat hortos.

10. A. tarſoſus.

L'Aſile noir liſſe, à pattes fauves & tarſes noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. niger glaber, femoribus tibiiſque rufis, alarum puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

11. A. marginatus.

L'Aſile noir liſſe à balanciers blancs & aîles bordées de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. niger glaber, halteribus albis, alis ſubrotundis obſcuris margine nigro.

Loc. Idem.

12. A. gibboſus.

L'Aſile à antennes en maſſue & aîles brunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, ſegmentis abdominalibus ſecundo & tertio margine flavis, alis fuſco nebuloſis.

Loc. Habitat prata.

13. A. clavicornis.

L'Aſile à antennes en maſſue, & aîles brunes bordées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, ſegmentis abdominalibus omnibus margine flavis, alis fuſcis margine albo.

Loc. Idem.

14. A. Schæfferi.

L'Aſile panaché de fauve & de noir à aîles noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite brevioribus clavatis ſetoſis, nigro rufoque varius, glaber, alis nigris, oris aculeo in medio incurvato.

Loc. Habitat prata.

15. A. armatus.

L'Aſile noir liſſe à pattes & devant de la tête fauves.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, fronte pedibuſque rufis, oris aculeo in medio incurvato.

Loc. Idem.

16. A. forcipatus.

L'Aſile cendré.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

A. cinereus hirſutus.

Loc. Habitat arva & prata.

17. A. tipuloïdes.

L'Aſile à pattes fauves allongées.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, thoracis lineis dorſalibus tribus nigris.

Loc. Idem.

18. A. reticulatus.

L'Aſile fauve à aîles réticulées.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

A. pallido-fulvus, thorace lineis dorſalibus tribus nigris, alis incumbentibus reticulatis.

Loc. Habitat arva & prata.

19. A. viridis.

L'Aſile vert doré.

Long. 2 ½ lig. Larg. ½ lig.

A. viridis nitens pedibus albis.

Loc. Habitat flores.

20. A. craſſipes.

L'Aſile noir à pieds de devant en maſſue.

Long. ½ lig. Larg. ⅓ lig.

A. niger, pedibus anticis articulo tarſi primo craſſo clavato.

Loc. Idem.

21. A. lacrymoſus.

L'Aſile larmoyant.

Long. 6 lig. Larg. 1 ⅓ lig.

A. thorace nigro lineis cinereis, abdomine fulvo, maculis nigris longitudinaliter poſitis.

Loc.

* 22. A. fulvopterus.

L'Aſile à aîles fauves.

Larg. 5 lig. Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, thorace lineis cinereis, alis fuſcis baſi fulvis.

Loc.

XCV. STRATIOMYS. *LA MOUCHE-ARMÉE.*

Antennæ ſetaceæ fractæ.
Os proboſcide abſque dentibus.
Thoracis apex aculeatus.
Ocelli tres.

FAMIL. I. *Thoracis aculeis duobus.*

1. S. chamæleon.

La Mouche-armée à ventre plat chargé de ſix lunules.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. fuſca, thorace ſubhirſuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano, lunulis ſex luteis.

Loc. Larva habitat aquam.

2. S. Schæfferi.

La Mouche-armée à ventre plat & brun.

S. fuſca, thorace hirſuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano immaculato.

Loc. Idem.

3. S. coccinea.

La Mouche-armée à corcelet rouge ſatiné.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

S. nigra, thorace ſericeo rubro utrinque ſpinoſo.

Loc.

4. S. hydroleon.

La Mouche-armée à ventre vert.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

X vj

S. fuſca, abdomine viridi faſciâ longitudinali nigrâ.

Loc.

5. S. albipes.

La Mouche-armée noire à pattes blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

S. nigra, tibiis albidis, alarum margine exteriore nigro.

Loc.

6. S. maculata.

La Mouche-armée noire à taches jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. atra, thorace abdomineque maculis flavis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

7. S. faſciata.

La Mouche-armée jaune à bandes noires.

Long. 2 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

S. luteo-vireſcens, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine tribus tranſverſis arcuatis nigris.

Loc. Habitat prata.

FAMILIA II. *Thoracis aculeis ſex.*

8. S. nigroptera.

La Mouche-armée noire à ventre & cuiſſes jaunes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigra, alis nigris, femoribus abdomineque luteis.

Loc. Idem.

XCVI. MUSCA. *LA MOUCHE.*

Antennæ è patellâ planâ ſolidâ, ſetâ laterali ſeu pilo.

Os proboſcide abſque dentibus.

Ocelli tres.

FAMILIA I. *Alis variegatis.*

1. M. groſſificationis.

La Mouche à aîles noires & tache blanche à l'extrémité.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis nigris, apice maculâ rotundâ albâ.

Loc. Habitat hortos.

2. M. morio.

La Mouche à aîles noires bordées de blanc ondé.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra hirſuta, margine alarum tenuiore ſinuato albicante.

Loc. Idem.

3. M. ſtellata.

La Mouche à l'étoile.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, alis albis apice maculâ rotundâ radiatâ.

Loc. Idem.

4. M. vibrans.

La Mouche à aîles vibrantes ponctuées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, apice nigris.

Loc. Habitat arbores.

5. M. groſſa.

La Mouche noire à baſe des aîles jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. atra, baſi alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat prata.

6. M. vivipara.

La Mouche noire à ventre brun & baſe des aîles fauve.

M. thorace atro, abdomine fuſco, baſi alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat hederam arboream.

7. M. cardui.

La Mouche à zig-zag ſur les aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, lineâ undulatâ fuſcâ ſigmoïdæâ.

Loc. Larva habitat cirſium.

8. M. ſigmoïdæa.

La Mouche à aîles réticulées avec une tache en zig-zag.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis, albo fuſcoque reticulatis, lineâ undulatâ ſigmoïdeâ nigriore.

Loc.

9. M. duplicata.

La Mouche à aîles réticulées avec deux taches noires.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. alis unguiculatis, albo fuſcoque reticulatis, maculâ duplici nigrâ.

Loc. Larva habitat capita helenii.

10. M. reticulata.

La Mouche à aîles réticulées à bandes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis albo nigroque reticulatis, faſciis tranſverſis obſcurioribus.

Loc. Habitat hortos.

11. M. trimaculata.

La Mouche à aîles jaunes chargées de points & de trois taches brunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. flava, alis fulvis, maculâ triplici, punctiſque plurimis fuſcis.

Loc.

12. M. punctifera.

La Mouche à aîles blanches chargées de points & de trois taches brunes.

M. cinerea, alis albis, maculâ triplici, punctiſque plurimis fuſcis.

Loc.

13. M. ſolſtitialis.

La Mouche des têtes de chardon.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis albis, faſciis tribus fuſcis, thoracis apice flavo.

Loc. Larva habitat cirſium & carduos.

14. M. 4-faſciata.

La Mouche jaune à quatre bandes brunes ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. flaveſcens, alis albis, faſciis quatuor transverſis fuſcis, nonnullis connexis, thorace punctis nigris.

Loc.

15. M. 5-faſciata.

La Mouche noire, à cinq bandes noires ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis albis, faſciis quinque tranſverſis nigris, nonnullis connexis.

Loc. Habitat hortos.

16. M. marmorata.

La Mouche à aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. fulva, alis unguiculatis fulvis fuſco marmoratis maculis albis.

Loc.

17. M. conferta.

La Mouche noire à aîles picotées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, alis rotundatis nigris punctis confertis albis.

Loc.

18. M. aſelliformis.

La Mouche noire à deux bandes blanches ſur les aîles.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis fuſcis faſciâ duplici tranſverſâ albâ.

Loc. Habitat ſylvas.

19. M. vitrata.

La Mouche à aîles vitrées.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace fuſco lineis pallidis, abdomine baſi luteâ punctis nigris; alis nigris maculis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Ore larvato.*

20. M. larvata.

La Mouche cendrée à quatre bandes noires ſur les aîles dont la troiſième eſt diviſée en deux.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, alis ſubfulvis, faſciis quatuor tranſverſis nigris, tertiâ interruptâ.

Loc. Habitat prata.

21\. M. perſonata.

La Mouche cendrée à points & aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, nigro punctata, alis albo fuſcoque marmoratis.

Loc.

22\. M. teſſellata.

La Mouche à aîles réticulées de brun.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis fuſco teſſelato-reticulatis.

Loc.

23\. M. claviformis.

La Mouche à corcelet noir à gros ventre jaune & aîles enfumées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine fulvo clavato, alis fuſco nebuloſis.

Loc. Habitat hortorum humum recentem.

24. M. cingulata.

La Mouche à zone.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig.

M. fulva, abdomine flavo, ſegmenti primi & ſecundi margine nigro, alis fulvo nebuloſis.

Loc.

25. M. longicornis.

La Mouche à tache brune ſur le bord de l'aîle & point noir au milieu.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace faſciis nigris, alarum margine externo maculis fuſcis, medio puncto nigro.

Loc.

26. M. aquatica.

La Mouche à bord des aîles jaunâtre, & trois points noirs ſur chacune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace faſciis fuſcis, alarum margine externo flaveſcente ſingulo punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat lentem paluſtrem.

27. M. geographica.

La Mouche à aîles géographiques.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine fulvo faſciâ longitudinali nigrâ, alis albo fuſcoque variegatis.

Loc.

FAMILIA III. *Variegatæ.*

28. M. veſpiformis.

La Mouche imitant la guêpe, à courtes antennes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, flavo variegata, alis fuſcis, antennis capite brevioribus.

Loc. Habitat flores.

29. M. feſtiva.

La Mouche imitant la guêpe, à longues antennes.

M. nigra, flavo variegata, alis fuſcis, antennis capite longioribus.

Loc.

30. M. interſecta.

La Mouche à corcelet noir taché de jaune, & ventre jaune à bandes noires.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace nigro, flavo maculato, abdomine flavo, faſciis tranſverſis nigris.

Loc. Habitat ſylvas.

31. M. bombyliformis.

La Mouche velue noire & fauve imitant le bourdon.

M. hirſuta nigra, thorace antice, abdomineque ſupra flavis.

Loc. Larva habitat radicem narciſſi.

32. M. ſaltatrix.

La Mouche jaune à bande noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. lutea, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine plurimis tranſverſis nigris.

Loc. Habitat folia plantarum.

33. M. hemiſphærica.

La Mouche noire, à ventre hémiſphérique roux tacheté de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra, abdomine hemiſphærico rufo, punctorum nigrorum ordine longitudinali.

Loc.

34. M. caudata.

La Mouche noire à ventre jaune noir dans le milieu.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M.

M. nigra, abdomine hemiſphærico luteo, faſciâ longitudinali nigrâ.

Loc. Larva habitat aquas ſtagnantes.

35. M. hortenſis.

La Mouche brune à bandes tranſverſes blanchâtres ſur le ventre.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

M. fuſca, marginibus inciſurarum abdominis cinereis, alis ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

36. M. aphidivora.

La Mouche noire à bandes tranſverſes jaunes ſur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. ⅓ lig.

M. nigra, marginibus inciſurarum abdominis flavis, alis fuſcis.

Loc. Habitat flores, aphides devorat.

37. M. nemorum.

La Mouche cendrée à bandes blanches ſur le ventre, & deux grandes taches jaunes ſur le premier anneau.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

M. thorace cinereo, abdominis baſi faſciâ luteâ interruptâ marginibus inciſurarum exalbidis.

Loc.

38. M. ribeſii.

La Mouche à quatre bandes jaunes ſur le ventre, dont la première eſt interrompue.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. abdomine ovato nigro, lunularum pari ſinguliſque tribus flaveſcentibus.

Loc. Habitat ribeſium.

39. M. interrupta.

La Mouche brune à deux taches jaunes à la baſe du ventre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. fuſca, abdominis baſi faſciâ luteâ interruptâ.

Loc. Habitat flores.

40. M. pendula.

La Mouche à corcelet ſtrié & bandes jaunes interrompues ſur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace ſtriis quatuor flavis; abdominalibus ſegmentis tribus interrupto-flavis.

Loc. Habitat flores.

41. M. inæqualis.

La Mouche à bandes jaunes alternativement plus larges ſur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro viridi, apice flavo, abdomine nigro faſciis tranſverſis luteis, alternis majoribus.

Loc. Habitat hortos.

42. M. transfuga.

La Mouche à pointe du corcelet & bande ſur le ventre de couleur jaune.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, apice flavo; abdomine nigro faſciis luteis tranſverſis æqualibus.

Loc. Habitat flores.

43. M. orbiculata.

La Mouche à points jaunes ronds ſur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{5}$ lig.

M. thorace nigro; abdomine atro, paribus tribus macularum rotundarum luteſcentium.

Loc. Larva aphides devorat.

44. M. mellina.

La Mouche à points jaunes triangulaires ſur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; abdomine oblongo, paribus tribus trigonorum luteſcentium.

Loc. Idem.

45. M. tetragona.

La Mouche à ſix points jaunes quarrés ſur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace nigro-viridi; abdomine oblongo, paribus tribus tetragonorum luteſcentium.

Loc. Larva aphides devorat.

46. M. quadrata.

La Mouche à quatre points jaunes ſur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, abdomine paribus duobus tetragonorum luteſcentium.

Loc. Habitat hortos.

47. M. pyraſtri.

La Mouche à ſix taches blanches en croiſſant ſur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, abdomine atro ovato, tribus paribus lunularum albicantium.

Loc. Habitat hortos; larva aphidivora.

48. M. lineata.

La Mouche dorée à trois paires de raies blanches ſur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. aurata abdomine nigro, tribus paribus linearum albicantium.

Loc. Habitat hortos.

49. M. vorax.

La Mouche brune à huit taches jaunes oblongues ſur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; abdomine atro, quatuor paribus macularum oblongarum flaveſcentium.

Loc. Larva aphidivora.

50. M. pipines.

La Mouche à groſſes cuiſſes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. oblonga femoribus poſticis majoribus.

Loc. Idem.

51. M. coaleſcens.

La Mouche à antennes réunies.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, abdominis medio ferrugineo antennis baſi coalitis.

Loc.

* 52. M. turcica.

La Mouche aux croiſſans d'or.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra thoracis lateribus & apice flavis, abdominis faſciis tribus arcuatis luteis interruptis, alarum margine luteſcente.

Loc.

53. M. cruentata.

La Mouche noire à bande rouge tranſverſe ſur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra, abdominis faſciâ tranſversâ rubrâ.

Loc. Rara in hortis.

* 54. M. doliata.

La Mouche à cerceaux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace hirſuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor flavis.

Loc.

55. M. apiformis.

La Mouche apiforme.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

M. fuſca; ſegmentis abdominalibus tribus margine albidis primo latere flavo, thorace vix maculato.

Loc. Larva habitat aquam ſtagnant. & mucum vegetabilem ex quo papyrus extrahitur.

* 56. M. adunata.

La Mouche à antennes en y grec.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, flavo variegata, alarum parte externa nigrâ, antennis baſi coalitis.

Loc.

FAMILIA IV. *Auratæ.*

57. M. cæſar.

La Mouche dorée commune.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace abdomineque viridi nitente pedibus nigris.

Loc. Larva habitat cadavera, undèquaque.

58. M. ſericea.

La Mouche cuivreuſe à pattes blanches.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace, abdomineque viridi ſericeo pedibus pallidis, alis albis.

Loc. Habitat hortos.

59. M. cuprea.

La Mouche verte cuivreuſe à aîles mi-parties de brun & de blanc.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi ſericeo, pedibus pallidis, alarum medio fuſco.

Loc. Habitat ſuperficiem aquæ & loca humida.

60. M. trinervis.

La Mouche dorée à trois nervures ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg $\frac{1}{4}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi nitenti pedibus ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat ſylvas.

61. M. cadaverina.

La Mouche dorée à corcelet bleu & ventre vert.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace cœruleo nitente, abdomine viridi nitente.

Loc. Larva habitat cadavera.

62. M. putris.

La Mouche à corcelet vert & ventre bleu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente, abdomine cœruleo nitente.

Loc. Idem.

63. M. vomitoria.

La Mouche bleue de la viande.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine cœruleo.

Loc. Habitat carnes apud laniones, &c. frequentiſſima.

64. M. hederacea.

La Mouche bleue à baſe des aîles fauve.

M. cœrulea, baſi alarum ferrugineâ.

Loc. Larva habitat hederam, vivipara.

65. M. cupraria.

La Mouche dorée à tache brune ſur les aîles.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga, capite viridi, thorace aureo, abdomine cupreo, alis maculâ fuſcâ.

Loc. Habitat hortos.

66. M. contracta.

La Mouche dorée à ventre brun & noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. oblonga, thorace æneo; abdomine anterius flavo, poſterius nigro.

Loc. Habitat ſylvas.

67. M. annulata.

La Mouche verdâtre à anneau blanc aux tarſes.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente abdomine æneo tarſorum annulo albo.

Loc. Habitat humum recentem, gallice (*les couches*).

68. M. plumbea.

La Mouche brune bronzée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. tota plumbea.

Loc.

* 69. M. ſmaragdina.

La Mouche à tête verte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. capite viridi, capite plumbeo nitente, pedibus flavis, alis nervoſis.

Loc.

FAMIL. V. *Vulgares.*

70. M. carnaria.

La grande Mouche à extrêmité du ventre rougeâtre.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

M. nigra, abdomine nitido teſſelato, thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus; ano fulvâ.

Loc. Habitat carnes & hortos; vivipara.

71. M. domeſtica.

La Mouche commune.

Long. 3 lig. Larg. ¾ lig.

M. nigra, abdomine nitido teſſellato, thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus, ano concolore.

Loc. Habitat domos, frequentiſſima.

72. M. cineraſcens.

La Mouche cendrée à poils noirs.

Long. 1 ⅔ lig. Larg. ½ lig.

M. cinerea tota, pilis nigris.

Loc. Larva habitat fimeta.

73. M. pluvialis.

La Mouche cendrée à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace quinque maculis nigris, abomine maculis tridentatis.

Loc. Larva habitat folia humida.

74. M. ſtercoraria.

La Mouche merdivore.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. hirſuta cinerea, alis puncto obſcuro.

Loc. Habitat fæces bovinas.

75. M. ſpinifera.

La Mouche noire à pattes épineuſes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, alis fuſcis, pedibus ſpinoſis.

Loc. Habitat arbores.

76. M. caracteriſtica.

La Mouche à caractères noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro, lineolis quatuor longitudinalibus albidis; abdomine fuſco, medio caracteribus nigris.

Loc. Habitat flores.

77. M. fulvipes.

La Mouche noire à pattes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat folia humida.

78. M. guttata.

La Mouche noire à tache blanche ſur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus halteribus abdominiſque maculâ albis.

Loc.

79. M. divaricata.

La Mouche toute noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, alis divaricatis pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

80. M. globulipes.

La Mouche à tarſes antérieurs très-gros.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, tarſis anticis clavatis craſſis.

Loc. Habitat hortos; rarior.

81. M. fallax.

La Mouche noire avec un trait noir ſur la moitié du bord extérieur de l'aîle.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra; alis albis, marginis exterioris medietate ſupernâ lineâ nigrâ.

Loc. Habitat flores.

82. M. fimetorum.

La Mouche noire à ailes brunes & yeux rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis fuſcis oculis rubris.

Loc. Habitat fimeta.

83. M. lateralis.

La Mouche noire avec le devant de la tête blanc, & les côtés du ventre fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra fronte albâ, abdominis lateribus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos & arva.

84. M. marginalis.

La Mouche à point marginal brun ſur les aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. fuſca, alis maculâ marginali fuſcâ.

Loc. Habitat hortos.

85. M. longipes.

La Mouche à point marginal ſur les aîles & pattes jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. fuſca, alis puncto marginali fuſco, pedibus flaveſcentibus.

Loc. Habitat flores.

86. M. tipulæa.

La Mouche griſe à pattes longues & jaunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, pedibus flaveſcentibus.

Loc. Idem.

87. M. Ichneumonoides.

La Mouche noire à pattes jaunes & ventre allongé, ſemblable à un ichneumon.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis, antennis abdomineque tenuibus productis.

Loc. Habitat hortos, rariſſima.

88. M. pulicaria.

La Mouche noire à pattes jaunes & bord extérieur des aîles noir.

Long. 1 lig. Long. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis alarum margine externo nigro.

Loc. Habitat flores.

89. M. libatrix.

La Mouche à aîles vibrantes ſans taches.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus rufis, alis vibrantibus immaculatis.

Loc. Habitat folia arborum in ſylvis.

90. M. cellaris.

La Mouche du vinaigre.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. ferrugineo fuſca, ſubpiloſa, oculis ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat vinum & acetum, frequentiſſima.

91. M. flava.

La Mouche jaune aux yeux noirs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flava, oculis nigris.

Loc. Habitat flores & domos.

92. M. pigra.

La Mouche jaune à bandes noires ſur le corcelet.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. flava, abdomine ſupra fuſco, thorace tribus ſtriis nigris.

Loc. Habitat flores.

93. M. cruciata.

La Mouche jaune à aîles bleuâtres & croiſées.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flaveſcens, oculis nigris, alis incumbentibus glaucis.

Loc. Habitat flores.

XCVII. STOMOXYS. *Le Stomoxe.*

Antennæ patellatæ ſetâ laterali piloſâ.

Os roſtro ſubulato ſimplici acuto.

Ocelli tres.

1. S. calcitrans.

Le Stomoxe.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

Loc. Habitat prata, autumnalis; equos laceſſit.

XCVIII. VOLUCELLA. *La Volucelle.*

Antennæ patellatæ ſetâ laterali piloſâ capiti inſidentes.

Os proboſcide vaginâ acutâ ſeu roſtro reconditum.

Ocelli tres.

1. V. pelluceus.

La Volucelle à ventre blanc en devant.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 lig.

V. abdomine antice albo, poſtice nigro, alis albis, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat roſam.

2. V. nigra.

La Volucelle à ventre tout noir.

Long. 5 ½ lig. Long. 3 lig.

V. tota nigra, pilis fulvis; alis albis maculâ nigrâ.

Loc. Idem.

3. V. flaveſcens.

La Volucelle à ventre jaunâtre.

Larg. 4 lig Long. 1 ½ lig.

V. thorace nigro, apice fulvo; abdomine flaveſcente.

Loc. Habitat hortos, rara.

* 4. V. maculata.

La Volucelle à tache noire.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 ⅓ lig.

V. nigra piloſa, abdominis apice pilis fulvis, alis albis macula nigra.

Loc. Habitat flores umbellatos & aquaticos.

XCIX. NEMOTELUS. *LA NEMOTELE.*

Antennæ moniliformes, ſtylo terminatæ roſtro inſidentes.

Os proboſcide, vaginâ acutâ ſeu roſtro reconditum.

Ocelli tres.

1. N. faſciatus.

La Nemotèle à bande.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

N. niger, abdomine niveo faſciis duabus nigris.

Loc. Habitat flores.

2. N. punctatus.

La Némotèle noire à ventre tacheté de blanc.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

N. niger, abdomine punctis albis.

Loc. Habitat prata humida.

3. N. ſtellaris.

La Némotèle à points d'argent.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

N. niger, hirſutie flava conſperſus, alarum baſi puncto argenteo.

Loc.

C. SCATHOPSE. *LE SCATOPSE.*

Antennæ filiformes.

Os proboſcide abſque dentibus.

Ocelli tres.

1. S. nigra.

Le Scatopſe noir.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

S. nigra.

Loc. Habitat loca humida & latrinas.

2. S. buxi.

Le Scatopſe du bouis.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. flava, alis albis.

Loc. Habitat folia buxi, quæ ſubtùs contorquet.

CI. HIPPOBOSCA. *L'Hippobosque.*

Antenn e ſetaceæ breviſſimæ ex unico pilo.
Os roſtro cylindrico obtuſo.
Ocelli tres.

1. H. equina.
La Mouche à chien.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
H. pedibus tetradactylis, alis cruciatis.
Loc. Habitat cutem canis, equi, &c.

2. H. hirundinis.
La Mouche araignée.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
H. pedibus ſexdactylis, alis divaricatis.
Loc. Habitat nidos hirundinum.

CII. TIPULA. *La Tipule.*

Antennæ filiformes, ſubpectinatæ (maribus ſæpe plumoſæ) capite multo longiores.
Os tentaculis incurvis articulatis.
Ocelli tres.

FAMILIA

FAMIL. I. *Alis patentibus.*

1. T. crocata.

La Tipule variée de brun, de jaune & de noir.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

T. corpore nigro, fulvo, flavoque variegata.

Loc. Larva habitat exæſas arbores.

2. T. rivoſa.

La Tipule à aîles panachées.

Long. Mâle 10 lig. Femelle 14 lig.

T. alis albis fuſco variegatis.

Loc. Habitat prata.

3. T. oleracea.

La Tipule à bords des aîls bruns.

Long. 8, 9 lig. Larg. 1 lig.

T. alis exalbidis, lineâ marginali fuſcâ.

Loc. Idem.

4. T. lunata.

La Tipule à aîles cendrées avec une tache blanche marginale.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. alis cineraſcentibus, lunulâ albâ marginali.

Loc. Habitat prata.

5. T. cornicina.

La Tipule jaune à points noirs rangés en trois bandes ſur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. alis ſubfuſcis, thorace flavo caracteribus nigris, abdomine luteo punctorum nigrorum lineis tribus longitudinalibus.

Loc. Idem.

6. T. caracteriſtica.

La Tipule jaune à tache marginale ſur les aîles, & à bande brune ſur le ventre.

Long. 5 lig. Long. 1 lig.

T. flava, alis ſubfuſcis, puncto marginali fuſco, thorace caracteribus nigris, abdomine lineâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat prata.

7. T. melanopis.

La Tipule jaune aux yeux noirs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. flava oculis nigris.

Loc. Idem.

8. T. contaminata.

La Tipule noire à taches jaunes & aîles maculées.

Long 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque maculis utrinque lividis, alis nigro maculatis.

Loc. Idem.

9. T. duplicata.

La Tipule brune à double point marginal.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fuſca, alis albis puncto marginali duplici fuſco.

Loc. Habitat prata.

10. T. nigra.

La Tipule noire à aîles brunes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis fuſcis, corpore atro.

Loc. Idem.

11. T. atra.

La Tipule toute noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. tota atra lævis.

Loc. Idem.

12. T. marginata.

La Tipule noire à ventre bordé de jaune.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. atra abdomine utrinque limbo ferrugineo.

Loc. Idem.

13. T. plumbea.

La Tipule de couleur plombée à aîles blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. plumbea, alis albis.

Loc. Habitat prata.

14. T. marginalis.

La Tipule jaune à point marginal de couleur cendrée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. flaveſcens, puncto marginali alarum cinereo.

Loc. Idem.

FAMIL. II. *Alis incumbentibus.*

15. T. teſſelata.

La Tipule à aîles en damier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis albo fuſcoque teſſelatis corpore fuſco.

Loc. Idem.

16. T. plumoſa.

La Tipule à corcelet vert & point marginal noir ſur les aîles.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fuſca, thorace vireſcente; alis pellucidis puncto nigro.

Loc. Habitat ripas aquarum.

17. T. littoralis.

La Tipule brune à ventre de couleur verte en devant.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fuſca, abdomine anterius viridi.

Loc Habitat folia in hortis, & vitra domorum.

18. T. motatrix.

La Tipule à pattes en forme d'antennes ornées d'un anneau blanc.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus, annulo albo.

Loc. Habitat prata.

19. T. vibratrix.

La Tibule à pattes en forme d'antennes ſans anneaux.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus immaculatis.

Varietas A. Corpore viridi.

B. Corpore fuſco, abdomine annulis pallidis octo.

Loc. Idem.

20. T. monilis.

La Tipule à pattes d'arlequin.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Long. $\frac{1}{4}$ lig.

T. pedibus albis annulis nigris, alis albis cinereo-maculatis.

Loc. Habitat prata & vitra domorum.

21. T. riparia.

La Tipule verte à aîles blanches ſans taches ni points.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. viridis, alis albis immaculatis.

Loc. Habitat undèquaque.

22. T. faſciata.

La Tipule verte à bande tranſverſe ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. viridis, alarum faſciâ tranſversâ fuſcâ.

Loc.

23. T. punctata.

La Tipule brune à quatre points bruns ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. fuſca, alis albidis, puncto quadruplici fuſco.

Loc. Habitat vitra domorum.

24. T. reticulata.

La Tipule à aîles réticulées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fuſca, alis albis fuſco reticulatis.

Loc. Habitat loca aquatica.

25. T. immaculata.

La Tipule brune à aîles blanches.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fuſca, alis albis immaculatis.

Loc.

26. T. atra.

La Tipule noire à aîles blanches.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. atra, alis niveis.

Loc. Habitat hortos.

27. T. variegata.

La Tipule à pattes noires & jambes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. luteo fuſcoque variegata, pedibus nigris, tibiis albis.

Loc. Habitat ſylvas & hortos.

28. T. conica.

La Tipule noire à aîles noires.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. atro-fuſca, alis nigris abdomine conico acuto.

Loc. Habitat loca humida domorum, & hortorum.

CIII. BIBIO. *Le Bibion.*

Antennæ taxiformes perfoliatæ, capite vix longiores.
Os tentaculis incurvis articulatis.
Ocelli tres.

1. B. marginalis.
Le Bibion noir à pattes jaunâtrès & point marginal.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig.
B. atro fuſcus, pedibus lividis, alarum puncto marginali fuſco.
Loc.

2. B. febrilis.
Le Bibion de S. Marc noir.
Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
B. ater hirſutus, alis albis margine exteriore nigro.
Loc. Habitat arbores æſtivo tempore.

3. B. hortulanus.
Le Bibion de S. Marc rouge.
Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. alis albis margine exteriore nigro, thorace abdomineque rubris.

Loc. Larva fæces bovinas habitat.

4. B. phalænoides.

Le Bibion à aîles frangées & ſans taches.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato lanceolatis, ciliatis immaculatis.

Loc. Habitat humida loca, & muros latrinarum.

3. B. ciliatus.

Le Bibion à aîles frangées & couvert de taches nébuleuſes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato-lanceolatis, ciliatis, nebuloſo maculatis.

Loc. Habitat arbores in ſylvis umbroſis.

CIV. CULEX. *Le Cousin.*

Antennæ pectinatæ (maribus plumoſæ.

Os ſiphone filiformi.

Ocelli nulli.

1. C. pipines.

Le Couſin commun.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, abdomine annulis fuſcis octo.

Loc. Habitat prata aquatica.

2. C. pulicaris.

Le Couſin à trois taches ſur les aîles.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{8}$ lig.

C. alis maculis tribus obſcuris, antennis apice bifurcis.

Loc. Habitat ſylvas & loca excelſa.

* 3. C. annulatus.

Le Couſin à pattes panachées.

Long.

C. fuſcus; alis nervoſis, pedibus albo interſectis.

Loc. Habitat adonides horti regii Pariſienſis.

SECTIO SEXTA.

INSECTA APTERA.

CV. PEDICULUS. *Le Pou.*

Pedes ſex.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Abdomen ſimplex.

1. P. humanus.
Le Pou ordinaire.
P. humanus.

2. P. pubis.
Le Morpion.
P. inguinalis.

3. P. bovis.
Le Pou du bœuf à ventre chargé de huit bandes tranſverſes.

P. bovis, abdomine lineis tranſverſis octo ferrugineis.

4. P. vituli.

Le Pou du bœuf à ventre de couleur plombée.

P. bovis abdomine plumbeo.

5. P. circi.

Le Pou du buſard.

P. circi, fuſcus oblongus, abdomine flaveſcente, medio lateribuſque fuſcis.

6. P. paſſeris.

Le Pou du moineau franc.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

P. ſubflaveſcens, abdomine ovato, medio diaphano, maculâ fuſcâ, lateribus punctato-ferrugineis.

7. P. columbæ.

Le Pou du pigeon.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

P. oblongus, filiformis, albicans, corporis lateribus utrinque ferrugineis.

8. P. corvi.
Le Pou du corbeau.
Long. 1 lig.
P. albo nigroque varius, abdomine ovato oblongo, utrinque inciſuris nigris.

9. P. meleagridis.
Le Pou du dindon.
P. galli-pavonis.

10. P. caponis.
Le Pou de la poule à ventre bordé de noir.
P. gallinæ, abdominis margine nigro.

11. P. gallinæ.
Le Pou de la poule à tête & corcelet pointus des deux côtés.
P. gallinæ, thorace capiteque utrinque mucronato.

12. P. pulſatorius.
Le Pou du bois.
P. ligni antiqui.

Pediculi Rhedi & Linnæi.

1°. Pediculus accipitris, abdomine oblongo.

2°. P. accipitris, abdomine ovato.

3°. P. gruis.

4°. P. fulicæ.

5°. P. picæ.

6°. P. ardeæ.

7°. P. ardeolæ.

8°. P. cygni, abdomine oblongo immaculato.

9°. P. cygni, abdomine ovato utrinque lineis fuſcis notato.

10°. P. lari.

11°. P. anſeris, capite ovato, abdomine oblongo, inciſuris utrinque maculatis.

12°. P. anſeris, capite triangulari, abdomine immaculato.

13°. P. pluvialis, abdomine margine ſimplici.

14°. P. pluvialis, abdomine margine dentato ſerrato.

15°. P. querquedulæ.

16°. P. falconis tinnunculi.

17°. P. pavonis, antennis dichotomis capite longioribus, abdomine utrinque immaculato.

18°. P. pavonis, antennis ſimplicibus capite brevioribus, abdomine immaculato.

19°. P. ſturni.

20°. P. ſternæ.

21°. P. recurviroſtræ.

22°. P. hæmathopi.

23°. P. lagopi.

24°. P. aſini.

25°. P. cervi, abdomine fuſco, medio albo.

26°. P. cervi, abdominis inciſuris punctis nigris.

N. B. Adde pediculos animalium exoticorum.

CVI. PODURA. *LA PODURE.*

Pedes ſex.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Abdominis cauda bifurca inflexa ſaltatrix.
Corpus ſquamis tectum.

FAMIL. I. *Globuloſæ.*

1. P. ſignata.

La Podure noirâtre à taches fauves ſur le ventre.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fuſco-nigra, abdomine globoſo ſignaturis ferrugineis.

Loc. Habitat lapides humidos.

2. P. viridis.

La Podure verte aux yeux noirs.

Long. $\frac{1}{4}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, capite flaveſcente, antennis in medio fractis.

Loc. Habitat plantas in menſe aprili.

3. P. longicornis.

La Podure brune enfumée.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fuſca non nitens, antennis longitudine corporis.

Loc. Habitat cortices arborum.

FAMILIA II. *Longæ.*

4. P. communis.

La Podure commune velue.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fuſco nigroque variegata villoſa.

Loc. Habitat lapides humidos.

5. P. livida.

La Podure jaune à anneaux noirs.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

P. livido-lutea, annulis tranſverſis nigris.

Loc. Idem.

6. P. annularis.

La Podure porte-anneau.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. nigra, thoracis limbo antennarumque baſi flavis, pedibus furcâque pallidis.

Loc. Habitat ligna exæſa.

7. P. viatica.

La Podure noire terreſtre.

Long. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

P. atra viatica.

Loc. Habitat vias, ſocialis.

7. P. aquatica.

La Podure noire aquatique.

P. atra aquatica.

Loc. Habitat ſuperficiem aquarum ſtagnantium.

9. P. plumbæa.

La Podure griſe commune.

Long. 1 lig.

P. plumbea.

Loc. Habitat arbores, prata ſolitaria.

10. P. violacea.

La Podure violette.

P. violacea.

Loc. Habitat cum communi.

CVII. FORBICINA. *LA FORBICINE.*

Pedes ſex origine latâ & ſquamoſâ.
Oculi duo.
Os tentaculis duobus mobilibus.
Antennæ filiformes.
Abdominis cauda tripilis.
Corpus ſquamis tectum.

1. F. ſaccharina.

La Forbicine platte.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

F. plana.

Loc. Habitat ligna exæſa, lapides, feneſtras undequaque.

2. F. ſaltatrix.

La Forbicine cylindrique.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.

F. teres ſaltatrix.

Loc. Id.; rarior.

CVIII. PULEX. *La Puce.*

Pedes ſex ſaltatorii.
Oculi duo.
Os inflexum.

1. P. irritans.
La Puce.

CIX. CHELIFER. *La Pince.*

Pedes octo.
Oculi duo.
Antennæ cheliformes roſtro longiores.

1. C. cancroides.
Le Scorpion araignée.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
C. fuſcus, abdomine lineis tranſverſis.
Loc. Habitat hortos ſub lapidibus.

2. C. longicornis.
La Pince rouge.
Long. $\frac{1}{3}$ lig.
C. totus ruber, antennis extremo biſetis.
Loc. Habitat ſub lapidibus & corticibus arborum.

CX. ACARUS. *La Tique.*

Pedes octo.

Oculi duo.

Antennæ ſimplices roſtro breviores.

1. A. ricinus.

La Tique des chiens.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, antennis brevibus ſubclavatis, abdomine antice maculâ ovatâ fuſcâ nitente.

Loc. Habitat aures canum.

2. A. ſiro.

Le Ciron de la galle.

A. humanus ſubcutaneus.

Loc. Habitat cutem humanam in ſcabie. An exiſtat verè inquirendum ?

3. A. caſei.

Le Ciron du fromage.

A. caſei antiqui.

Loc. Habitat caſeum.

4. A. coleoptreorum.

La Mitte des coleoptères.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

A. inſectorum rufus, ano albicante.

Loc. Habitat ſcarabæos.

5. A. gymnopterorum.

La Mitte rouge des mouches.

A. gymnopterorum ruber, punctorum coccineorum utrinque pari.

Loc. Habitat annulos muſcæ.

6. A. muſcarum.

La Mitte brune des mouches.

A. rufus muſcarum, pedibus poſticis longis filiformibus.

Loc. Idem.

7. A. holoſericeus.

La Tique rouge ſatinée terreſtre.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. terreſtris ruber abdomine depreſſo.

Loc. Habitat prata & gramina ſicca.

8.

8. A. aquaticus.

La Tique rouge ſatinée aquatique.

A. aquaticus ruber abdomine depreſſo.

Loc. Habitat aquas ſtagnantes.

9. A. ſtagnalis.

La Tique aquatique panachée.

A. aquaticus niger, abdominis medio lateribuſque flavis.

Loc. Habitat ſtagna.

10. A. petrarum.

La Tique rouge des pierres à pattes antérieures fort longues.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

A. petrarum ruber, pedibus anticis longitudine corporis.

Loc. Habitat ſuperficiem lapidum.

11. A. lucidus.

La Tique noire & liſſe des pierres.

Long. $\frac{1}{4}$ lig.

A. petrarum niger, abdomine globoſo lucido, femoribus ſubclavatis.

Loc. Idem.

12. A. coleoptratus.

La Tique noire à ventre anguleux en devant.

A. ater, lateribus abdominis antrorſum acutis.

Loc. Habitat lapides & muros.

13. A. textor.

Le Tiſſerand d'automne.

A. fuſcus, autumnalis, textor.

Loc. Habitat corticem arborum, quas ſericeo filo obveſtit.

24. A. veſpertilionis.

La Tique de la chauve-ſouris.

Long. 1 lig.

A. fuſcus, ovatus, pedibus pallidis, veſpertilionis.

Loc. Habitat corpus veſpertilionis.

CXI. PHALANGIUM. *LE FAUCHEUR.*

Pedes octo.
Oculi duo.
Antennæ anguloſæ.
Tentacula duo longa antenniformia.

1. P. opilio.

Le Faucheur.

Loc. Habitat undèquaque.

CXII. ARANEA. *L'ARAIGNÉE.*

Pedes octo,
Oculi duo.

FAMILIA I. *Oculi in lunam diſpoſiti.*

1. A. viatica.

L'Araignée à pattes de devant longues & arlequinées.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 lig.

A. thorace fuſco, abdomine luteſcente, pedibus quatuor poſticis breviſſimis, anticis longis luteo nigroque interſectis.

Loc. Habitat plantas.

2. A. citrina.

L'Araignée citron.

Long. 4 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. citrino-lutea, pedibus quatuor poſticis breviſſimis, abdomine utrinque faſciâ ferrugineâ.

Loc. Idem.

3. A. extenſa.

L'Araignée à ventre cylindrique & pattes de devant étendues.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. abdomine longo argenteo vireſcente, pedibus longitudinaliter extenſis.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

4. A. faſciata.

L'Araignée brune à trois raies tranſverſes blanches ſur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. fuſca, thorace lineis quatuor obliquis fuſcis, abdomine tribus tranſverſis albis.

Loc. Habitat hortos.

5. A. interſecta.

L'Araignée à ventre roux rayé de noir & pattes arlequinées.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine ferrugineo flavo lineis tranſverſis contiguis, nigris pedibus fuſco ferrugineoque interſectis.

Loc. Habitat arva.

FAMILIA II. *Oculi in quadratum diſpoſiti.*

6. A. parietina.

L'Araignée brune domeſtique.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

A. atro-fuſca, ſubvilloſa, pedibus atro fuſcoque interſectis.

Loc. Habitat angulos murorum, domeſtica.

7. A. aquatica.

L'Araignée brune aquatique.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

A. aquatica tota fuſca.

Loc. Habitat aquam ſtagnantem.

8. A. foliata.

L'Araignée porte-feuille.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

A. pallida, abdomine folium longitudinaliter extenſum pallide nigrum referente.

Loc. Habitat prata.

9. A. dumetorum.

L'Araignée à feuille coupée.

Long. 4 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. livido rufa, abdominis picturâ foliaceâ nigrâ, luteo interſectâ, pedum annulis nigris.

Loc. Habitat ſylvas, telam verticalem conſtruit.

10. A. papalis.

L'Araignée à croix papale.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

A. livido rufa, abdomine cruce triplici luteâ.

Loc. Habitat hortos.

11. A. longipes.

L'Araignée rougeâtre à ventre jaune ponctué de noir.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

A. pallido-rufa, abdomine flaveſcente punctis nigris.

Loc. Habitat arbores.

12. A. vittata.

L'Araignée à bande rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. pallida, abdomine ovato flavo, faſciâ longitudinali coccineâ.

Loc. Habitat cupreſſum, in horto regio.

13. A. phalangiodes.

L'Araignée domeſtique ſemblable au faucheur.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. fuſco-flaveſcens, pedibus longis corpore triplo longioribus.

Loc. Habitat domos.

FAMILIA III. *Oculi in duas lineas diſpoſiti.*

14. A. marmorata.

L'Araignée à feuille découpée & déchiquetée.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. livido-rufa, abdominis picturâ foliaceâ ſæpius interruptâ, pedibus nigro maculatis.

Loc. Habitat plantas, filum horiſontalem conſtruit.

FAMILIA IV. *Oculi in tres lineas diſpoſiti.*

15. A. lupus.

L'Araignée loup.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. tota fuſca fuliginea.

Loc. Habitat arva ſine filo.

16. A. paluſtris.

L'Araignée cendrée à trois lignes blanches ſur le corcelet.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

A. tota cinereo-villoſa, thoracis lineâ triplici albidâ.

Loc. Habitat prata humida.

17. A. ſcenica.

L'Araignée ſauteuſe aux trois chevrons blancs.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. ſaliens nigra, abdomine utrinque lineis tribus albis ad angulum acutum coeuntibus.

Loc. Habitat arva & domos.

FAMILIA V. *Oculi in ſerta diſpoſiti.*

18. A. meticuloſa.

L'Araignée domeſtique à longues pattes.

A. longipes, thorace pedibuſque pallidis, abdomine plumbeo fuſco.

Loc. Habitat domos.

CXIII. MONOCULUS. *LE MONOCLE.*

Pedes ſex.

Oculus unus.

Antennæ multiplices ſetis plurimis lateribus.

Corpus cruſtâ tectum.

1. M. pulex.

Le Perroquet d'eau.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

M. antennis dichotomis, caudâ inflexâ.

Loc. Habitat aquam ſtagnantem, quam ſanguineo colore tingit.

2. M. pediculus.

Le Monocle à queue retrouſſée.

M. antennis dichotomis, caudâ reflexâ.

Loc. Habitat aquam ſtagnantem, quam ſanguineo colore tingit.

3. M. quadricornis.

Le Monocle à queue fourchue.

M antennis quaternis, caudâ rectâ bifidâ.

Loc. Idem.

4. M. conchaceus.

Le Monocle à coquille longue.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, teſtâ bivalvi oblongâ.

Loc. Idem.

5. M. teſtaceus.

Le Monocle à coquille courte.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, teſtâ bivalvi globoſâ.

Loc. Idem.

CXIV. BINOCULUS. *Le Binocle.*

Pedes ſex.
Oculi duo.
Antennæ ſimplices ſetaceæ.
Cauda bifida.
Corpus cruſtâ tectum.

1. B. apus.
Le Binocle à queue en filets.
Long. 18 lig. Larg. 10 lig.
B. caudâ biſetâ.
Loc. Habitat aquam, rarus.

2. B. foliaceus.
Le Binocle à queue en plumet.
Long. 2 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.
B. hæmiſphæricus, caudâ foliaceâ, capitis puncto triplici fuſco.
Loc. Habitat rivulos.

3. B. gaſteroſtei.
Le Binocle du gaſteroſtée.
B. gaſteroſtei.
Loc. Idem.

CXV. CANCER. *Le Crabe.*

Pedes decem, primi cheliformes.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Cauda folioſa.
Corpus cruſtâ tectum.

1. C. aſtacus.
L'Ecreviſſe.
C. macrourus, roſtro ſupra ſerrato, baſi utrinque dente ſimplici, thorace integro.
Loc. Habitat fluvios, rivos.

2. C. pulex.
La Crevette des ruiſſeaux.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig.
C. macrourus rufeſcens, thorace articulato.
Loc. Habitat rivulos.

CXVI. ONISCUS. *Le Cloporte.*

Pedes quatuordecim.
Antennæ duæ fractæ.

1. O. armadillo.

Le Cloporte armadille.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

O. caudâ obtuſâ integerrimâ.

Loc. Habitat ſylvas.

2. O. aſellus.

Le Cloporte ordinaire.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

O. caudâ obtuſâ bifurcâ.

Loc. Habitat loca humida locorum.

CXVII. ASELLUS. *L'Aselle.*

Pedes quatuordecim.

Antennæ quatuor fractæ, duæ longiores.

1. A. aquaticus.

L'Aſelle d'eau douce.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. caudâ bifidâ ſtylitis bifurcis, articulis ſeptem.

Loc. Habitat rivos.

CXVIII. SCOLOPENDRA. *LA SCOLOPENDRE.*

Pedes ad minimum viginti quatuor, ſæpe plus.

Corpus planum.

Antennæ filiformes, articulis brevibus plurimis.

1. S. forficata.

La Scolopendre à trente pattes.

Long. 9 à 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufa, pedibus utrinque quindecim.

Loc. Habitat ſub lapidibus in hortis.

2. S. coleoptrata.

La Scolopendre à vingt-huit pattes.

Long. 8 lig.

S. nigricans, pedibus utrinque quatuordecim albo nigroque interſectis.

Loc. Id. rarior.

3. S. nigricans.

La Scolopendre à ſoixante pattes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. fuſca, pedibus utrinque triginta.

Loc. Idem.

4. S. phoſphorica.

La Scolopendre à cent quarante pattes.

Long. 8 à 9 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. ferruginea, pedibus utrinque ſeptuaginta.

Loc. Habitat terram.

5. S. fuſca.

La Scolopendre à cent quarante-quatre pattes.

Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. fuſca, pedibus utrinque ſeptuaginta duobus.

Loc. Idem.

6. S. lagura.

La Scolopendre à pinceau.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ovalis, pedibus utrinque duodecim, caudâ albo penicillo.

Loc. Habitat cortices arborum.

CXIX. JULUS. *L'Iule.*

Pedes plus quàm centum.
Corpus teres cylindraceum.
Antennæ articulis quinque.

1. J. terreſtris.

L'Iule à deux cens pattes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

J. fuſcus lævis, pedibus utrinque centum.

Loc. Habitat ſub lapidibus.

2. J. ſabuloſus.

L'Iule à deux cens quarante pattes.

Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

J. cinereus, pedibus utrinque centum & viginti.

Loc. Idem

FINIS.